

米的山地疏林。

本种的外观近似普洱茶 *C. assamica* (Mast.) Chang, 但子房无毛, 叶下面被柔毛, 可资区别。

158. 膜叶茶

Camellia leptophylla S. Y. Liang ex Chang l. c. **20** (1): 95. 1981; Tax. Gen. *Camellia* 118. 1981.

灌木, 嫩枝有毛, 很快变秃, 叶薄膜质, 长圆形或狭圆形, 长 8—9.5 厘米, 宽 3—4 厘米, 先端短尖, 尖头钝, 基部楔形, 上面干后暗褐色, 无光泽, 下面浅绿色, 无毛, 侧脉 7—8 对, 在上下两面均明显, 边缘有疏锯齿, 齿刻相隔 4—7 毫米, 叶柄长约 1 厘米, 多少有毛或变秃。花 1—2 朵顶生或腋生, 白色, 花柄长 4—6 毫米, 无毛; 苞片 2 片, 位于花柄中部, 早落; 萼片 5 片, 近圆形, 长 6—7 毫米, 无毛, 边缘有睫毛, 宿存; 花瓣 9 片, 倒卵形, 长 9—11 毫米, 背面无毛, 基部略连生; 雄蕊离生, 花丝无毛, 基部略与花瓣合生; 子房无毛, 花柱长 8 毫米, 无毛, 先端 3 裂。花期 10 月。

模式标本采自广西龙州大青山。

本种和茶树很接近, 只是叶片薄膜质, 花瓣较多, 子房无毛。

159. 秃房茶 图版 33: 1—3

Camellia gymnogyna Chang l. c. **20** (1): 94. 1981; Tax. Gen. *Camellia* 116. 1981; Chang et Bartholomew *Camellias*, 144. 1984.

灌木, 嫩枝无毛, 芽体有毛。叶革质, 椭圆形, 长 9—13.5 厘米, 宽 4—5.5 厘米, 先端急尖, 尖头长 1.5 厘米, 末端钝, 基部阔楔形, 上面干后暗绿色, 无光泽, 下面灰色, 无毛, 侧脉 8—9 对, 在上下两面均隐约可见, 边缘有疏锯齿, 齿刻相隔 3—5 毫米, 叶柄长 7—10 毫米, 完全无毛。花 2 朵腋生, 花柄长 1 厘米, 粗壮, 无毛; 苞片 2 片, 位于花柄中部, 早落; 萼片 5 片, 阔卵形, 长 6 毫米, 无毛; 花瓣 7 片, 倒卵圆形, 长 2 厘米, 白色, 背面无毛, 基部连生; 雄蕊多数, 3—4 轮, 花丝离生, 长 1—1.2 厘米, 无毛; 子房无毛, 花柱长 1.2 厘米, 无毛, 先端 3 裂, 裂片长 2 毫米。蒴果 3 裂开, 果片阔椭圆形, 厚 7 毫米; 种子 1 个, 中轴长 1.4 厘米。花期 12 月至翌年 1 月。

产云南西畴、贵州雷山及习水、四川筠连及广东高州。模式标本采自广西凌乐老山, 海拔 1400 米。

本种与茶树 *C. sinensis* O. Ktze. 不同的特征在于全体无毛, 叶片较大, 花柄稍长, 子房秃净无毛。

160. 突肋茶

Camellia costata Hu et S. Y. Liang ex Chang in Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni **20** (1): 94. 1981; Tax. Gen. *Camellia* 117. 1981; Chang et Bartholomew *Camellias*, 144. 1984.