

长 3 毫米，花瓣长 8—9 毫米。

组 15. 超长柄茶组 Sect. *Longissima* Chang Tax. Gen. *Camellia*, 124, 1981; Chang et Bartholomew *Camellias*, 153. 1984.

花腋生，单花，小形，有长柄；苞片 2，早落，位于长花柄的中部；萼片 5，宿存；花瓣 7—8 片，近离生；雄蕊 1—2 轮，近离生；子房 3 室，花柱短，3 裂。蒴果从基部开裂。

本组模式种：超长柄茶 *C. longissima* Chang et Liang

本组有 3 种，我国有 2 种，广西、云南各 1 种。越南北部有 1 种。本组的种类叶片已不含咖啡碱，亦缺可可碱。

分种检索表

1. 叶椭圆形，侧脉与中肋几相垂直，花柱顶端 3 裂 … 174. 超长柄茶 *C. longissima* Chang et Liang
1. 叶长圆形，侧脉与中肋呈锐角开出，花柱全裂 …………… 175. 河口超长柄茶 *C. hekouensis* Wang et Fan

174. 超长柄茶 图版 35: 6—7

Camellia longissima Chang et Liang Tax. Gen. *Camellia* 124. 1981; Chang et Bartholomew *Camellias*, 153. 1984.

灌木，嫩枝无毛，老枝灰色。叶膜质，椭圆形或倒卵形，长 14—16.5 厘米，宽 6—8.5 厘米，先端急短尖，尖尾长约 1 厘米，基部近圆形或楔形，两面干后暗褐色，无毛，侧脉 14—19 对，几与中脉垂直，在上下两面均突起，网脉不明显，边缘有细锯齿，齿刻相隔 2—3 毫米，叶柄长 4—7 毫米，无毛。花 1—3 朵顶生或侧生，有长柄，花柄长约 4 厘米，下部纤细，上部略增厚，无毛；苞片 2 片，位于花柄中部，相隔 6—7 毫米，早落；萼片 5 片，阔卵形至圆形，长 5 毫米，无毛；花瓣 8 片，分离，椭圆倒卵形，长约 1 厘米，宽 7—8 毫米，无毛；雄蕊长 7—8 毫米，离生，无毛；子房 3 室，无毛，花柱长 12 毫米，先端 3 浅裂。花期冬春间。

模式标本采自广西龙津县板闭，海拔 440 米。

本种的嫩枝无毛，叶薄膜质，椭圆形，侧脉多达 19 对，几与中脉垂直，花柄极长，花萼及花瓣无毛，雄蕊离生，子房 3 室，无毛，花柱短，3 浅裂。

175. 河口超长柄茶

Camellia hekouensis Wang et Fan in Acta Bot. Yunnan. 7 (3): 365—366. 1988.

小乔木，嫩枝无毛。叶薄革质，长圆形，长 16—25 厘米，宽 3.5—6.5 厘米，先端急锐尖，基部阔楔形或近圆形，上下两面均无毛，侧脉 14—18 对，与中肋作 45° 锐角开

出, 在叶面干后略下陷, 网脉不明显, 边缘有细锯齿, 叶柄长约 1 厘米。花白色, 1—3 朵腋生, 花柄长 2.5—3.5 厘米, 纤细, 无毛; 苞片 3 片, 在花柄上互生; 萼片 5, 阔卵形或近圆形, 长 3—5 毫米, 无毛; 花瓣 7 片, 离生, 倒卵形, 长 7—10 毫米, 无毛; 雄蕊长 5—7 毫米, 离生; 子房 3 室, 花柱 3 条, 长 3—5 毫米。蒴果未见。

模式标本采自云南河口, 海拔 350 米的常绿林中。

本种的叶脉斜出, 而与超长柄茶 *C. longissima* Chang et Liang 有别, 其余特征基本上相似。

组 16. 秃茶组 Sect. *Glaberrima* Chang Tax. Gen. *Camellia*, 125, 1981; Chang et Bartholomew *Camellias*, 153, 1984; Chang in Act. Sci. Nat. Univ. Sunyatseni 35 (3): 15. 1996.

花 1—3 朵腋生或顶, 较小, 白色, 有柄; 苞片 2, 早落; 萼片 5, 宿存; 花瓣 7—8, 略连生; 雄蕊 2 轮, 下半部连成短管; 子房 3 室, 无毛, 花柱 3 裂。蒴果每室有种子 1 个。

本组模式种: 秃山茶 *C. glaberrima* Chang

本组有 3 种, 全产我国云南、贵州及广东。

这个组和茶组及管蕊组 *Calpandria* 接近。与茶组的区别在于绝对无毛, 花丝连成短管。与管蕊组的区别在于花丝下半部连成短管。在系统发育上, 从本组过渡到花丝完全连生成管的管蕊组 *Calpandria* (Bl.) Coh. St.。本组的种类不含茶碱及咖啡碱, 亦与茶组有别。

分 种 检 索 表

1. 叶长于 10 厘米, 花柄长 1 厘米。
 2. 叶大, 长 11—18 厘米, 长尾状, 尾长 1—2 厘米, 侧脉明显 176. 秃茶 *C. glaberrima* Chang
 2. 叶较小, 长 9—14 厘米, 先端渐尖, 侧脉不明显 ... 177. 广东秃茶 *C. kwangtungensis* Chang
1. 叶短于 10 厘米, 花柄长 1.5 厘米以上 178. 丹寨秃茶 *C. danzaiensis* K. M. Lan

176. 秃茶 图版 36: 1—3

Camellia glaberrima Chang Tax. Gen. *Camellia* 126. 1981; Chang et Bartholomew *Camellias*, 154—155. 1984.

小乔木, 高 7—8 米, 嫩枝及嫩叶均无毛。叶革质, 长圆形, 长 11—18 厘米, 宽 4—5 厘米, 先端渐尖或长尾状, 尾长 1—2 厘米, 基部楔形或钝, 上下两面深灰褐色, 不发亮, 无毛; 侧脉 7—8 对, 在上面明显, 在下面稍突起, 边缘上半部有细钝齿, 齿刻相隔 3—5 毫米; 叶柄长 1—1.3 厘米, 极秃净。花单生于枝顶, 花梗长 1 厘米, 秃净; 苞片 2