

房无毛，3室，花柱先端3裂。花期12月至翌年1月。

模式标本采自广东乳源县。

本种和尖连蕊茶 *C. cuspidata* Wright 很接近，只是叶片较大，花大，萼片长1厘米，基部连生，花柄粗大，长1.5厘米。

180. 尖连蕊茶 尖叶山茶 (中国高等植物图鉴) 图版 37: 1—3

Camellia cuspidata (Kochs) Wright ex Gard. Chron. Ser. 3. **L1**: 228. fig. 123. 1912; Sealy Rev. Gen. *Camellia* 55, 1958; Chang Tax. Gen *Camellia* 134, 1981. — *Thea cuspidata* Kochs in Engler Bot. Jahrb. **27**: 586, 1900. — *Thea rosaeiflora* var. *glabra* Kochs l. c. 472, 1900.

180a. 尖连蕊茶

var. *cuspidata*

灌木，高达3米，嫩枝无毛，或最初开放的新枝有微毛，很快变秃净。叶革质，卵状披针形或椭圆形，长5—8厘米，宽1.5—2.5厘米，先端渐尖至尾状渐尖，基部楔形或略圆，上面干后黄绿色，发亮，下面浅绿色，无毛；侧脉6—7对，在上面略下陷，在下面不明显；边缘密具细锯齿，齿刻相隔1—1.5毫米；叶柄长3—5毫米，略有残留短毛。花单独顶生，花柄长3毫米，有时稍长；苞片3—4片，卵形，长1.5—2.5毫米，无毛；花萼杯状，长4—5毫米，萼片5片，无毛，不等大，分离至基部，厚革质，阔卵形，先端略尖，薄膜质；花冠白色，长2—2.4厘米，无毛；花瓣6—7片，基部连生约2—3毫米，并与雄蕊的花丝贴生，外侧2—3片较小，革质，长1.2—1.5厘米，内侧4或5片长达2.4厘米；雄蕊比花瓣短，无毛，外轮雄蕊只在基部和花瓣合生，其余部分离生，花药背部着生；雌蕊长1.8—2.3厘米，子房无毛；花柱长1.5—2厘米，无毛，顶端3浅裂，裂片长约2毫米。蒴果圆球形，直径1.5厘米，有宿存苞片和萼片，果皮薄，1室，种子1粒，圆球形。花期4—7月。

产江西、广西、湖南、贵州、安徽、陕西、湖北、云南、广东、福建。模式标本采自四川 Wushan。

本变种的枝条无毛，花较大，萼杯状，长4—5毫米，无毛，花瓣无毛，雄蕊无毛，花丝几乎完全离生，子房无毛。

180b. 大花尖连蕊茶 (变种)

var. *grandiflora* Sealy in Kew Bull. 216. 1950.

本变种和原变种的区别在于花柄长7毫米，萼片长6毫米，花长3.5—4厘米。

模式标本采自湖南武冈云山。

180c. 浙江尖连蕊茶 (变种)

var. *chekiangensis* Sealy Rev. Gen. *Camellia* 58. 1958.

本变种比原变种具有被毛的花梗、苞片及萼片，花柄长4—5毫米。