

雌蕊无毛，长10—14毫米；子房卵圆形，长2毫米；花柱长8—12毫米，先端3裂，长2.5—5毫米。果实圆球形，直径1.5厘米，有宿存苞片及萼片，1室，有种子1粒。

花期1—2月。

产云南西部和南部。模式标本采自云南楚雄。

184b. 尖萼连蕊茶 (变种)

Camellia forrestii Cohen St. var. **acutisepala** (Tsai et Feng) Chang Tax. Gen. Camellia 138. 1981. — *Camellia acutisepala* Tsai et Feng in Acta Phytotax. Sin. 1: 189. pl. 10. 1951.

灌木至小乔木，嫩枝有毛。叶革质，卵形，长2—4.5厘米，宽1.1—2厘米，先端渐尖，末端钝，基部阔楔形，上面有光泽，下面无毛，侧脉5—6对，边缘有钝锯齿，叶柄长2—4毫米，有毛。花白色，花柄极短，苞片3—4片，卵形，长2—3毫米，无毛，先端尖；萼片5，长卵形，长5—7毫米，无毛，先端尖；花瓣倒卵形，长1—1.3厘米，先端略尖，无毛；雄蕊离生，长8—10毫米；子房无毛，花柱长7—10毫米，先端3浅裂。蒴果球形，直径1.5厘米，有种子1粒，果柄长3—4毫米。

模式标本采自云南景东黄草岭。

它与原变种蒙自连蕊茶 *C. forrestii* var. *forrestii* 作比较，只是萼片先端略尖，Sealy 错误地把广西全州标本，钟济新 81616 定为本变种，其实那份标本是长萼连蕊茶 *C. longisepala* Chang.

185. 荔波连蕊茶

Camellia lipoensis Chang et Xu in Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni, 25 (2): 98. 1986.

灌木至小乔木，高4米，嫩枝略被柔毛。叶革质，长卵形，长2—3.2厘米，宽1—1.6厘米，先端长尾状，基部近圆形，上面干后深绿色，下面在中脉上有微毛，其余无毛，侧脉不明显；边缘在中部以上有细锯齿，齿距2—3毫米；叶柄长1—1.5毫米，多少有微毛，花白色，顶生及腋生，直径2厘米，花柄长2毫米；苞片4，阔卵形，长1毫米，有睫毛；萼片5，连成杯状，长2毫米；花瓣7，阔倒卵形，长7—13毫米，基部略连生，边缘有睫毛，雄蕊长4—8毫米，着生于花瓣基部，花丝离生，花药长1毫米；子房2—3室，无毛；花柱长5—10毫米，无毛，先端2裂或3裂。蒴果未见。

模式标本采自贵州荔波县的石灰岩山地。

本种和四川产的黄杨叶连蕊茶 *C. buxifolia* Chang 较接近，但叶为长卵形，基部圆形，萼片连成杯状，花瓣7片。

186. 黄杨叶连蕊茶 图版40: 1—2

Camellia buxifolia Chang Tax. Gen. Camellia 139. 1981; Chang et Bartholomew, Camellias, 166—168. 1984.