

形，密生灰毛；花冠白色，长 1.5—2 厘米，花瓣 5—6 片，基部与雄蕊相连约 4 毫米，最外 2 片近圆形，长 7—9 毫米，宽 6—11 毫米，革质，近先端有毛，内侧 3—4 片阔卵形，游离部分长 1.4—1.7 厘米，无毛，或近先端有毛；雄蕊长 11—13 毫米，无毛，花丝管长为雄蕊的一半或三分之二；子房无毛，花柱长 1.2 厘米，先端 3 裂，裂片长 3 毫米。果实有宿存苞片及萼片，果柄长 4—5 毫米；蒴果圆球形，宽 1.2 厘米，长 1.1 厘米，2—3 片裂开，果片厚 0.5 毫米。

产江西吉安、贵州遵义及广西。模式标本采自湖南岳麓山。

本种很接近阿里山连蕊茶 *C. transarisanensis* Coh. St.，只是花柄略长，苞片 5 片。

194. 三花连蕊茶 银花茶 (广西)

Camellia triantha Chang Tax. Gen. *Camellia* 144. 1981; Chang et Bartholomew *Camellias*, 172. 1984.

灌木，嫩枝有短柔毛。叶膜质，椭圆形或倒卵状长圆形，长 8—10 厘米，宽 3—4 厘米，先端收窄而尾状长尖，尾长 1—1.5 厘米，基部阔楔形或钝，上面干后褐绿色，无光泽，中脉上有短柔毛，下面灰色，沿中脉有长丝毛，表面多少瘤状突起，侧脉 7—8 对，在上面能见或稍陷下，在下面稍突起，边缘密生相隔 1—1.5 毫米的细锯齿。花 3 朵顶生，或腋生单花，花柄长 3—4 毫米，有灰柔毛；苞片 5 片，半圆形至圆形，长 1—1.5 毫米，有灰柔毛；萼片 5 片，基部微连合，圆形，长 2.5—3 毫米，被灰柔毛；花瓣 5 片，外侧 2 片广卵形，背有灰毛，内侧 3 片，倒卵形，背有毛，基部略相连；雄蕊比花瓣短，基部略与花瓣相连，外轮花丝连合成管，长为花丝的 2/3，游离花丝短，无毛；子房无毛，花柱比雄蕊短，无毛，先端 3 浅裂。花期 10—11 月。

模式标本采自广西邕宁。

本种在连蕊茶亚属里，具有较大而薄膜状的叶片，花萼及花瓣有毛，雄蕊连合成花丝管，无毛，子房无毛，花柱 3 浅裂。它近似长尾毛蕊茶 *C. caudata* Wall.，后者花丝有毛，子房及花柱亦被毛。在具有秃净雌蕊的一组里，它近似五室连蕊茶 *C. stuartiana* Sealy，后者的花丝管短，心皮及柱头 5 数。

195. 贵州连蕊茶 图版 42: 3—4

Camellia costei Lév. in Fedde Rep. Sp. Nov. 10: 148. 1911. — *Thea costei* (Lév.) Rehd. in Journ. Arn. Arb. 15: 98. 1934; Chang Tax. Gen. *Camellia* 146. 1981.

灌木或小乔木，高达 7 米，嫩枝有短柔毛。叶革质，卵状长圆形，先端渐尖，或长尾状渐尖，基部阔楔形，长 4—7 厘米，宽 1.3—2.6 厘米，上面干后深绿色，发亮，中脉有残留短毛，下面浅绿色，初时有长毛，以后秃净，侧脉约 6 对，在上面隐约可见，在下面稍突起，边缘有钝锯齿，齿刻相隔 1—3 毫米，叶柄长 2—4 毫米，有短柔毛。花顶生及腋生，花柄长 3—4 毫米，有苞片 4—5 片；苞片三角形，先端尖，最长 2 毫米，先端有毛；花萼杯状，长 3 毫米，萼片 5 片，卵形，长 1.5—2 毫米，先端有毛；花冠白色，