

1981. — *Thea transnokoensis* (Hay.) Makino et Nemoto Fl. Jap. ed 2: 745.

1931. — *Theopsis transnokoensis* (Hay.) Nakai in Journ. Jap. Bot. 16: 707. 1940.

灌木或小乔木，高6米，嫩枝纤细，有柔毛。叶薄革质，长圆形或卵状长圆形，长3—5厘米，宽1—1.7厘米，先端渐尖，基部楔形，上面干后深绿色，有光泽，中脉有柔毛，下面黄褐色，无毛，侧脉在上下两面均不明显，边缘有细锯齿，齿刻相隔1.5—2毫米，叶柄长约2毫米，有毛。花顶生及腋生，花柄长2.5毫米，无毛，有苞片3—4片；苞片卵形，长1—2毫米，边缘有睫毛；萼片5片，阔卵形，长2—3毫米，先端圆，背无毛，边缘有睫毛；花冠白色，无毛，花瓣5—6片，基部与雄蕊相连生；雄蕊无毛，花丝管短；子房无毛，花柱先端3浅裂。

模式标本采自台湾南投。

198. 川鄂连蕊茶（中国高等植物图鉴） 图版43: 4—6

Camellia rosthorniana Hand.-Mazz. in Anz. Akad. Wiss. Math. Nat. Mien. 61: 108. 1925; Chang l. c. 148. 1981. — *Thea rosthorniana* (H.-M.) Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 394. 1931.

灌木，高3米，嫩枝纤细，密生短柔毛。叶薄革质，椭圆形或卵状长圆形，长2.5—4.2厘米，宽9—18毫米，先端长渐尖，尖头略钝，基部楔形至阔楔形，上面干后暗绿色，无光泽，中脉有残留短毛，下面通常无毛；侧脉约6对，在上下两面隐约可见，边缘密生细小尖锯齿，齿刻相隔1—1.5毫米，叶柄长2—3毫米，有柔毛。花腋生及顶生，白色，花柄长3—4毫米，有苞片3—4片；苞片卵形或圆形，最长达2毫米，无毛，先端有睫毛；花萼杯状，长3毫米，萼片5片，不等长，卵形至圆形，长1.5—3毫米，背无毛，边缘有睫毛；花冠白色，长11—14毫米，花瓣5—7片，基部2—3毫米与雄蕊相结合，最外侧2—3片倒卵形或圆形，有睫毛，内侧3—4片倒卵形，先端圆或凹入；雄蕊长10毫米，无毛，花丝管长4毫米；子房无毛，花柱长9—13毫米，先端极短3裂。果实有宿存苞片及萼片，果柄长5毫米；蒴果圆球形，直径10—14毫米，1—2室，每室有种子1—2粒，2—3片裂开，果片薄。花期4月。

产湖北、湖南、广西、四川。模式标本采自四川的Chin Shan, Hwangtsaopin.

199. 桫叶连蕊茶

Camellia euryoides Lindl. in Bot. Reg. t. 983. 1826; Chang Tax. Gen. *Camellia* 151. 1981. — *Thea euryoides* (Lindl.) Booth in Trans. Hort. Soc. London 7560. 1830. — *Camellia theiformis* Hance in Ann. Sci. Nat. Paris Ser. 4. 15: 221. 1861. — *Thea theiformis* (Hance) O. Ktze. Rev. Gen. 64. 1891.

灌木至小乔木，高达6米，嫩枝纤细，有长丝毛。叶薄革质，椭圆形至卵状椭圆形，长2—4厘米，宽7—14毫米，先端略尖而有钝的尖头，基部楔形或近于圆形，上面干后深绿色，有光泽，中脉有短毛，下面有稀疏长丝毛，侧脉不明显，边缘有相隔1.5—2.5



图版 43 1—3. 川滇连蕊茶 (变种) *Camellia tsaii* var. *synapatica* (Sealy) Chang: 1. 花枝, 2. 花, 3. 子房及萼。4—6. 川鄂连蕊茶 *Camellia rosthorniana* Hand. -Mazz.: 4. 花枝, 5. 除
去花瓣的花蕾, 6. 萼及花柱。(谢庆建仿黄锦添)