

毛，边缘有睫毛；花冠白色，长 1.6 厘米；花瓣 6 片，倒卵形，先端圆，无毛，基部略相连生；雄蕊长约 1.3 厘米，外轮花丝下半部连生成短管，上半部分离，无毛，花药背部着生；子房无毛，花柱长 1.3 厘米，无毛，先端极短 3 浅裂。蒴果圆球形，直径 1.2 厘米，1 室，种子 1 粒，果片薄。 花期 1 月。

模式标本采自广东大埔铜鼓山，分布到江西。

201b. 短柄细叶连蕊茶 (变种)

var. **brevipes** Chang Tax. Gen. Camellia 151. 1981.

小乔木，嫩枝有毛。叶卵形，长 3 厘米，宽 8—13 毫米，先端渐尖，基部略圆，果柄长 4 毫米，苞片 4—5 片，散生；萼片阔卵形，长 2 毫米，无毛。蒴果宽 10 毫米。

模式标本采自江西武功山。

202. 七瓣连蕊茶

Camellia septempetala Chang et L. L. Qi in Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni **29** (2): 92. 1990.

202a. 七瓣连蕊茶 (原变种)

var. **septempetala**

灌木，高 3 米，嫩枝有微毛，旋变秃，顶芽无毛。叶革质，卵状披针形，长 6—8 厘米，宽 1.8—2.8 厘米，先端尾状渐尖，尾长 1.7 厘米，基部略圆或钝，上面干后深绿色，稍发亮，下面黄绿色，无毛；侧脉 5—6 对，与网脉在上面略能见，在下面不明显；边缘有细锯齿，叶柄长 4—5 毫米，上部有微毛。花白色，1—2 朵生枝顶，花柄长约 3 毫米；苞片 3—4 片，长 1.5—2 毫米，无毛；萼片 5，卵圆形，长 5—8 毫米，无毛；花瓣 7 片，倒卵形，长 1.5 厘米，基部略连生；雄蕊长 1.2 厘米，基部连生，有短花丝管，无毛；子房无毛，花柱长 1.2 厘米，无毛，先端 3 浅裂。

模式标本采自湖南东安大庙口一带，海拔 800 米的山地常绿林。

本种近似长尖连蕊茶 *C. acutissima* Chang，但叶片较大，萼片较长，不连生成短管。

202b. 红花七瓣连蕊茶 (变种)

var. **rubra** Chang et L. L. Qi l. c. 93. 1990.

与原变种的区别，在于花红色。

模式标本采自湖南东安大庙口一带，与原变种混生。

203. 长管连蕊茶 图版 45: 4—7

Camellia elongata (Rehd. et Wils.) Rehd. in Journ. Arn. Arb. **3**: 224. 1922; Sealy Rev. Gen. Camellia 93. 1958, Chang Tax. Gen. Camellia 152. 1981. — *Thea elongata* Rehd. et Wils. in Sargent Pl. Wils. **2**: 392. 1915. — *Thea caudata* var. *faberi* Kochs in Engler Bot. Jahrb. **27**: 583. 1900. — *Theopsis elongata* (Rehd. et Wils.) Nakai in Journ. Jap. Bot. **16**: 705. 1940.