

模式标本采自汕头大洋山，分布到广西大苗山。

叶较大，先端长尾状，两面或下面有小瘤状突起，果片厚3毫米，无毛，3室。可能和五室连蕊茶 *C. stuartiana* Sealy 较近缘，后者子房5室，果壳稍薄。

206. 五室连蕊茶

Camellia stuartiana Sealy in Kew Bull. 220. 1949; Rev. Gen. *Camellia* 65. 1958; Chang Tax. Gen. *Camellia* 155. 1981; Chang et Bartholomew *Camellias*, 184. 1984.

小乔木，高6米，嫩枝纤细，密生短柔毛。叶薄革质，阔椭圆形或长椭圆形，长7—11厘米，宽3—4厘米，先端渐尖或尾状渐尖，基部阔楔形，上面深绿色，中脉上有短毛，下面有稀疏丝毛，侧脉6—8对，略能见，边缘有相隔2毫米的细锯齿，叶柄长5—7毫米，有短柔毛。花顶生或近枝顶腋生，有短柄，花柄长3毫米，散生有5片苞片；苞片阔三角形，先端尖，长1—1.5毫米，有长丝毛；花萼杯状，长3—4毫米，宽5—6毫米，萼片阔卵形至圆形，长2—3毫米，背面有毛，内侧无毛；花冠白色，长1.7厘米，花瓣5—7片，基部与雄蕊合生约4毫米，最外2片近圆形，几分离，长6—10毫米，革质，有毛，内侧3—5片近圆形，先端圆，长1.6—1.7厘米，宽9—12毫米，背部有柔毛；雄蕊长15毫米，无毛，外轮雄蕊的花丝管长6—7毫米；子房无毛，5室，花柱长17毫米，先端4—5裂，裂片长7—9毫米。果实有长约5毫米的短柄，有宿存苞片及萼片；蒴果圆球形，直径2—2.5厘米，果壳1.5毫米，1室，种子1个。花期2月。

模式标本采自云南元江。

207. 阿里山连蕊茶 (中山大学学报) 阿里山茶 (台湾树木志)

Camellia transarisanensis (Hay.) Coh. St. in Bull. Jard. Bot. Buitenz. ser. 3. 1: 320. 1919; H. L. Li Woody Fl. Taiw. 584, 1963; Chang Tax. Gen. *Camellia*. — *Thea parvifolia* Hayata Ic. Pl. Formos. 3: 45. t. 61913. non. Salisb. — *Thea transarisanensis* Hayata Ic. Pl. Formos. 5: 10. 1915. — *Camellia parvifolia* (Hay.) Coh. St. in Meded. Proefst. Thee 40: 68. 1916. — *Theopsis transarisanensis* (Hay.) Nakai in Journ. Jap. Bot. 16: 707. 1940.

灌木，高2.5米，多分枝，嫩枝有柔毛。叶薄革质，长圆形，长2.5—4.5厘米，宽8—15毫米，先端钝，基部楔形或阔楔形，上面干后深绿色，略发亮，中脉上有短毛，下面浅绿色，无毛，侧脉在上下两面均不明显，边缘有钝锯齿，齿刻相隔1.5—2毫米，叶柄长2—4毫米，有毛。花柄短，顶生及腋生；苞片3片覆盖在长约2.5毫米的花柄上，卵形，长2毫米，有毛；花萼杯状，长4毫米；萼片5片，阔卵形，长3—4毫米，外面有绢毛，内侧无毛；花冠白色，长1.8厘米，花瓣5—6片，基部3—6毫米与雄蕊相连生，最外1—2片革质，游离部分圆形，长7—8毫米，有毛，内侧4片倒卵形，游离部分长1—1.3厘米；雄蕊长1.6厘米，无毛，花丝管长1—1.3厘米；子房无毛，花柱长1.1厘米，先端3浅裂。