

微毛；萼片5片，长卵形，长5—7毫米，外面被微毛；花瓣5片，倒卵形，长1.5厘米，基部连生，外面有微毛；雄蕊长1.2厘米，花丝基部连生成短管，无毛；子房无毛，3室，花柱长1.5厘米，无毛，先端3裂。蒴果长卵形，长约2.2厘米，3片裂开，果片厚1毫米，种子1—2个。

模式标本采自湖南永州一带，海拔800米的山地常绿林。

叶长卵形，先端长尾状，侧脉不明显，萼片长卵形，先端三角形而钝，被微毛，蒴果长卵形，先端略尖，易与长果连蕊花 *C. longicarpa* Chang 区别。

215. 披针叶连蕊茶

Camellia lancilimba Chang Tax. Gen. *Camellia* 161. 1981; Chang et Bartholomew *Camellias*, 189. 1984.

灌木，高3米，嫩枝纤细，有灰色柔毛。叶薄革质，狭披针形，长5.5厘米，宽1—1.3厘米，先端尾状渐尖，尾长1—1.5厘米，基部阔楔形或钝。上面干后绿褐色，稍发亮，中脉有短毛，下面无毛，侧脉5—7对，在上下两面均很不明显，边缘密生细锯齿，齿刻相隔约1毫米，叶柄长3—4毫米，有柔毛。花顶生及腋生，花柄极短；苞片3片，阔卵形，长1.5—2.5毫米，有微毛；萼浅杯状，长5毫米，被短柔毛，上半部5裂，裂片卵形，先端钝；花瓣5，白色，阔倒卵形，基部略相连生，外侧2片革质，有微毛，其余花瓣倒卵形，有微毛；雄蕊比花瓣短，外轮花丝下半部连合成短管，上半部游离，无毛；子房无毛，花柱无毛，先端3浅裂。花期9—10月。

模式标本采自广东乳源及连南县的山地常绿林。

本种近似川鄂连蕊茶 *C. rosthorniana* H.-M.，但叶狭长，花柄短，萼杯状，较长，被柔毛，花瓣亦有毛。

系3. 毛连蕊茶系 Ser. *Trichandrae* Chang Tax. Gen. *Camellia*, 163, 1981; Chang et Bartholomew *Camellias*, 192. 1984.

花丝连生成短管，花丝或花丝管被毛，子房秃净。

本系模式种：金屏连蕊茶 *C. tsingpiensis* Hu

本系有9种，全产我国。

216. 金屏连蕊茶 图版48: 1—5

Camellia tsingpiensis Hu in Bull. Fan. Mem. Inst. Biol. Bot. 8: 129. 1938; Chang Tax. Gen. *Camellia* 163. 1981.

216a. 金屏连蕊茶 (原变种)

var. *tsingpiensis*

灌木至小乔木，高达7米，嫩枝有柔毛。叶薄革质，长卵形，长5—8厘米，宽1.5—2.6厘米，先端尾状渐尖，基部阔楔形或近圆形，上下两面干后淡褐色，不发亮，在中脉