

微毛；萼片5片，长卵形，长5—7毫米，外面被微毛；花瓣5片，倒卵形，长1.5厘米，基部连生，外面有微毛；雄蕊长1.2厘米，花丝基部连生成短管，无毛；子房无毛，3室，花柱长1.5厘米，无毛，先端3裂。蒴果长卵形，长约2.2厘米，3片裂开，果片厚1毫米，种子1—2个。

模式标本采自湖南永州一带，海拔800米的山地常绿林。

叶长卵形，先端长尾状，侧脉不明显，萼片长卵形，先端三角形而钝，被微毛，蒴果长卵形，先端略尖，易与长果连蕊花 *C. longicarpa* Chang 区别。

215. 披针叶连蕊茶

Camellia lancilimba Chang Tax. Gen. *Camellia* 161. 1981; Chang et Bartholomew *Camellias*, 189. 1984.

灌木，高3米，嫩枝纤细，有灰色柔毛。叶薄革质，狭披针形，长5.5厘米，宽1—1.3厘米，先端尾状渐尖，尾长1—1.5厘米，基部阔楔形或钝。上面干后绿褐色，稍发亮，中脉有短毛，下面无毛，侧脉5—7对，在上下两面均很不明显，边缘密生细锯齿，齿刻相隔约1毫米，叶柄长3—4毫米，有柔毛。花顶生及腋生，花柄极短；苞片3片，阔卵形，长1.5—2.5毫米，有微毛；萼浅杯状，长5毫米，被短柔毛，上半部5裂，裂片卵形，先端钝；花瓣5，白色，阔倒卵形，基部略相连生，外侧2片革质，有微毛，其余花瓣倒卵形，有微毛；雄蕊比花瓣短，外轮花丝下半部连合成短管，上半部游离，无毛；子房无毛，花柱无毛，先端3浅裂。花期9—10月。

模式标本采自广东乳源及连南县的山地常绿林。

本种近似川鄂连蕊茶 *C. rosthorniana* H.-M.，但叶狭长，花柄短，萼杯状，较长，被柔毛，花瓣亦有毛。

系3. 毛连蕊茶系 Ser. *Trichandrae* Chang Tax. Gen. *Camellia*, 163, 1981; Chang et Bartholomew *Camellias*, 192. 1984.

花丝连生成短管，花丝或花丝管被毛，子房秃净。

本系模式种：金屏连蕊茶 *C. tsingpiensis* Hu

本系有9种，全产我国。

216. 金屏连蕊茶 图版48: 1—5

Camellia tsingpiensis Hu in Bull. Fan. Mem. Inst. Biol. Bot. 8: 129. 1938; Chang Tax. Gen. *Camellia* 163. 1981.

216a. 金屏连蕊茶 (原变种)

var. *tsingpiensis*

灌木至小乔木，高达7米，嫩枝有柔毛。叶薄革质，长卵形，长5—8厘米，宽1.5—2.6厘米，先端尾状渐尖，基部阔楔形或近圆形，上下两面干后淡褐色，不发亮，在中脉

上都有残留短毛，侧脉 6—8 对，在上下两面均隐约可见，边缘有密细锯齿，叶柄长 2—5 毫米。花顶生及腋生，花柄极短，苞片 4 片，半月形至圆形，长 1—2 毫米，背无毛，边缘薄膜状，略有睫毛；花萼无毛，萼片 5 片，阔卵形，长 2—3.5 毫米，无毛；花瓣 5 片，长 10—14 毫米，白色，基部与雄蕊连合约 3 毫米，游离部分倒卵形，先端圆；雄蕊长 8—13 毫米，花丝管长为雄蕊之半，分离花丝有白色长毛；子房无毛，花柱长 9—12 毫米，先端 3 浅裂。蒴果圆球形，直径 1 厘米，1 室，种子 1 个，3 片裂开，果片薄。花期 1—3 月。

产广西（临桂）和云南。越南也有分布。模式标本采自云南金屏。

216b. 毛萼金屏连蕊茶（变种）

var. *pubisepala* Chang Tax. Gen. *Camellia* 163. 1981; Chang et Bartholomew *Camellias*, 192. 1984.

叶椭圆状卵形，长 4—6 厘米，尾状渐尖，花柄长 1—2 毫米；苞片 5，萼片卵圆形，长 4 毫米，有柔毛；花瓣 5 片，长 1—1.2 厘米，背面有毛；外轮花丝管长为雄蕊 3/5，游离花丝略有毛；子房无毛。花期 10 月。

产广西那坡德窝乡念头山、贵州榕江等地。

和原变种比较，花萼及花瓣有毛，花丝管稍长。

217. 小卵叶连蕊茶

Camellia parvi-ovata Chang et S. S. Wang ex Chang Tax. Gen. *Camellia* 163. 1981; Chang et Bartholomew l. c. 192. 1984.

灌木至小乔木，高 2—3 米，嫩枝有短粗毛。叶薄革质，卵状披针形，长 4—6 厘米，宽 1.5—2 厘米，先端渐尖，基部近圆形，上面暗晦，下面无毛，侧脉约 9 对，边缘有细锯齿，叶柄长 2—3 毫米，有毛。花腋生及顶生，白色，花柄长 4—5 毫米；苞片 4，散生，无毛；萼片长 5 毫米，基部连成浅杯状，先端圆形，无毛；花瓣 6—7 片，阔倒卵形，长 1.5 厘米，两面多少有微毛；雄蕊约与花瓣等长，下半部连成短管，游离花丝有毛；子房无毛，花柱稍略超出雄蕊，3 浅裂。蒴果未见。

模式标本采自四川峨眉山大峨寺。

近似金屏连蕊茶 *C. tsingpiensis* Hu，但花柄长 4—5 毫米，花萼较大，长约 5 毫米，基部连生，花丝管稍长，叶片较小。

218. 绿萼连蕊茶 图版 50: 1

Camellia viridicalyx Chang et S. Y. Liang ex Chang l. c. 164. 1981; Chang et Bartholomew *Camellias*, 193. 1984.

灌木，高 1—2 米，嫩枝有褐色短柔毛。叶革质，披针形或卵状披针形，长 3.5—5.5 厘米，宽 1—1.6 厘米，先端尾状渐尖，尾长 1—1.5 厘米，基部阔楔形或略圆，上面干后绿色，不发亮，中脉有微毛，下面黄褐色，无毛，侧脉约 7 对，在上面隐约能见，在