

下面不明显，边缘有细锯齿，齿刻相隔 1.5—2 毫米；叶柄长 2—3 毫米，有短柔毛。花顶生，花柄极短；苞片 4 片，卵形，长 1.5—2.5 毫米，背面有短柔毛，边缘有睫毛；萼片 5 片，长 5—6 毫米，基部略相连生，卵圆形，背面有短柔毛，边缘也有睫毛；花瓣 5 片，倒卵形，基部相连生，背面有短柔毛；雄蕊比花瓣短，外轮花丝连合过半，游离花丝有短柔毛；子房无毛，花柱约与雄蕊等长，无毛，先端极短 3 裂。

模式标本采自广西贺县姑婆山，分布到湖南道县。

本种近似金屏连蕊茶 *C. tsingpiensis* Hu，但花萼及花瓣有柔毛，花丝管较长。

219. 披针萼连蕊茶

Camellia lancicalyx Chang Tax. Gen. *Camellia* 165. 1981; Chang et Bartholomew *Camellias*, 193—194. 1984.

灌木，嫩枝有短柔毛。叶革质，披针形，长 4—5 毫米，宽 1—1.3 厘米，先端尾状渐尖，基部钝或略圆，上面干后深绿色，发亮，中脉有毛，下面浅绿色，无毛，侧脉 7—8 对，在上下两面均不明显，边缘有钝锯齿，叶柄长 2—3 毫米，有柔毛。花 1—2 朵生于枝顶叶腋，白色，花柄极短。苞片 3 片位于花柄基部，卵形，被毛；萼片 5 片，披针形或长圆形，长 3—4 毫米，宽 1.5 毫米，基部几离生，先端略尖或钝，背面有柔毛；花瓣 6 片，最外 2 片卵形，长 6—8 毫米，背有毛，内侧 4 片长圆形，长 1—1.2 厘米，宽 2—3 毫米，基部连生约 2 毫米，背有短绢毛；雄蕊长 1 厘米，下半部连生成花丝管，无毛，上半部花丝离生，有柔毛；子房无毛，花柱长 1 厘米，先端 3 浅裂。花期 10 月。

模式标本采自广西武鸣大明山。

本种近似半秃连蕊茶 *C. subglabra* Chang，但萼片披针形，多毛，花瓣长圆形，宽仅 3 毫米。

220. 小长尾连蕊茶 图版 50: 2—3

Camellia parvicaudata Chang Tax. Gen. *Camellia* 166. 1981; Chang et Bartholomew *Camellias*, 195. 1984.

灌木，嫩枝有短柔毛。叶革质，细小长圆形或长圆披针形，长 2.5—3.5 厘米，宽 8—13 毫米，先端尾状渐尖，基部阔楔形或钝，上面橄榄绿色，稍发亮，中脉有短毛，下面黄绿色，无毛，侧脉 7—8 对，在上面隐约可见，在下面明显，边缘密生细锯齿，齿刻相隔 0.5—1 毫米，叶柄长 2 毫米，有短粗毛。花顶生及腋生，花柄长 1—2 毫米；苞片 4—5 片，半圆形至阔卵形，长 0.5—1.5 毫米，被柔毛，萼片 5 片，阔卵形，长 2.5 毫米，先端钝，背面有柔毛；花冠紫红色，长 8—9 毫米，花瓣 5 片，基部相连生，且与雄蕊的花丝管相结合，外侧 2 片倒卵圆形，长 6—7 毫米，背面多毛，革质，内侧 3 片阔倒卵形，长 8—9 毫米，背面有毛；雄蕊长 7 毫米，外轮花丝基部 2 毫米相结合成短管，游离花丝长 4 毫米，有柔毛；子房无毛，花柱长 1.3 厘米，先端 3 浅裂。花期 12 月。

模式标本采自广西大明山，见于德保县黄连山。