

3 裂。花期 3 月。

模式标本采自台湾能高山。

本种和南投秀连蕊茶 *C. transnokoensis* Hay.、细萼连蕊茶 *C. tsofui* Chien、贵州连蕊茶 *C. costei* Lévl. 有许多近似的特点，但本种的花丝有毛，便于识别。

江苏标本 (Y. C. Yang 468) 的叶子较小，宽 7—9 毫米，长 2.5—3.5 毫米，其余特征都很一致。

223. 细萼连蕊茶 图版 44: 3—4

Camellia tsofui Chien in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China Bot. 12: 91. fig. 2. 1939; Sealy Rev. Gen. Camellia 9. 1958; Chang Tax. Gen. Camellia 168. 1981; Chang et Bartholomew Camellias, 196. 1984.

灌木，高 1—2 米，嫩枝有粗毛。叶薄革质，卵状披针形，长 3—5.5 厘米，宽 1.2—1.7 厘米，先端渐尖或尾状渐尖，基部钝，上面干后暗绿色，无光泽，中脉略有短毛，下面初时有稀疏长丝毛，以后变秃净，侧脉约 7 对，在上面不明显，在下面稍突起，边缘有相隔 1.5—2.5 毫米的锯齿，叶柄长 2—3 毫米。花有长柄，花柄长 5—6 毫米，有苞片 4—6 片；苞片细小，近圆形，有微毛及睫毛；花萼杯状，长 2 毫米，萼片 5 片，圆形，长 1—1.5 毫米，有微毛及睫毛；花冠白色，长 1.8 厘米，花瓣 5 片，基部与雄蕊连合约 3 毫米，外侧 2 片阔倒卵形，先端圆，长 6—7 毫米，内侧 3 片近圆形，长 1.3—1.5 厘米，均有睫毛，或有微毛；雄蕊长 1.8 厘米，花丝管长 5—6 毫米，游离花丝有毛；子房无毛，花柱长 1.4—2 厘米，先端 3 浅裂。蒴果圆球形，直径 1.2 厘米。花期 3—4 月。

产湖南、江西、四川。模式标本采自四川重庆北碚。

224. 毛丝连蕊茶 图版 49: 1—3

Camellia trichandra Chang Tax. Gen. Camellia 168. 1981; Chang et Bartholomew Camellias, 199. 1984.

灌木，嫩枝秃净或有微毛。叶薄革质，狭倒卵形，长 4—7.5 厘米，宽 1.5—2.5 厘米，先端尾状渐尖，基部楔形，侧脉 6—8 对，边缘有钝齿，叶柄长 3—4 毫米，有毛。花生枝顶，花柄长 1—2 毫米。苞片 4，卵形，长 1 毫米；萼片 5，卵形，长 2 毫米，先端钝，有睫毛；花瓣 5，长圆形，长 1.3—1.8 厘米，宽 5—7 毫米，基部连生，无毛；雄蕊长 1.5 厘米，花丝管长 8—9 毫米，游离花丝有毛；子房无毛，花柱长 1.4 厘米。蒴果扁三球形，3 室，宽 1 厘米（未成熟），种子每室 1 个。

模式标本采自广西凌乐老山，分布到云南富宁。

嫩枝近无毛或有微毛，叶狭倒卵形，花顶生，花柄极短，萼片 4，萼长 2 毫米，有睫毛，外轮花丝有毛，蒴果 3 室。



图版 44 1—2. 毛枝连蕊茶 *Camellia trichoclada* (Rehd.) Chien; 1. 果枝, 2. 果。

3—4. 细萼连蕊茶 *Camellia tsofui* Chien; 3. 花枝, 4. 花柱和萼。(蔡淑琴绘)