

12. 花长3厘米, 果宽1.5—2厘米, 2—3室, 果壳厚于1.5毫米, 萼片长4—5毫米, 果柄长6毫米 236. 香港毛蕊茶 *C. assimilis* Champ.
10. 叶边全缘 237. 无齿毛蕊茶 *C. edentata* Chang
6. 萼片线状披针形, 长1—1.5厘米, 被长毛, 叶披针形, 基部圆形 238. 柳叶毛蕊茶 *C. salicifolia* Champ.
225. 小果毛蕊茶 图版 51: 4—5

Camellia villicarpa Chien in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China Bot. 12: 99. 1939. ———*Camellia obscurinervis* Tsai et Feng in Bull. Phytotax. Inst. Acad. Sin. 1 (2): 90. t. 12. 1953; Chang Tax. Gen. *Camellia* 170. 1981.

灌木, 高2.6米, 嫩枝多披散柔毛。叶薄革质, 长2—4厘米, 宽1—1.5厘米, 椭圆形, 先端钝渐尖, 基部楔形, 上面深绿色, 干后灰暗无光泽, 中脉上有短柔毛, 下面沿中脉有稀疏长毛, 侧脉在两面均不明显, 边缘钝锯齿相隔约2毫米, 叶柄长约2毫米, 有柔毛。花单生于枝顶, 长1.3厘米; 苞片2—3片, 覆盖在长约2—3毫米的花柄上, 无毛; 萼片5片, 近圆形, 长1—2毫米, 有微毛, 先端圆, 有睫毛; 花冠白色, 无毛, 长1厘米; 花瓣5片, 最外1片倒卵形, 长7—8毫米, 内侧4片, 长1厘米, 仅基部2毫米相连生; 雄蕊长8毫米, 无毛, 基部2毫米与花瓣相连, 其余部分完全分离; 子房有毛, 花柱长6—7毫米, 无毛, 先端3浅裂, 裂片长1—2毫米。果实圆球形, 直径1—1.3厘米, 有毛, 果壳薄。花期4—5月。

模式标本采自四川灌县。

226. 杯萼毛蕊茶 图版 52: 5

Camellia cratera Chang Tax. Gen. *Camellia* 170. 1981; Chang et Bartholomew *Camellias*, 200—201. 1984.

灌木或小乔木, 高5米, 嫩枝有灰褐色柔毛。叶革质, 狭长圆形或长圆状披针形, 长7厘米, 宽1.5—2.5厘米, 先端尾状渐尖, 尾长1.5—2厘米, 基部狭楔形, 上面干后灰绿色, 稍暗晦, 中脉有短毛, 下面无毛, 侧脉6—7对, 在上面隐约可见, 在下面不明显, 边缘有相隔2—3毫米的细锯齿, 叶柄长2—4毫米, 有柔毛。花腋生及顶生, 花柄长5—6毫米, 有毛, 上部增大; 苞片5片, 散生在花柄上, 下部3片细小, 半圆形, 上部2片贴近萼片, 近圆形, 长2—2.5毫米, 有毛; 萼杯状, 长5—6毫米, 被柔毛, 上部分裂为5片萼片, 裂片半圆形, 长2—2.5毫米, 先端圆; 花冠紫红色, 花瓣6—7片, 外侧2片倒卵圆形, 长1厘米, 被毛, 内侧4—5片, 倒卵形, 长1.5厘米, 外面有毛, 基部与雄蕊相连约3毫米; 雄蕊长1.2—1.4厘米, 除基部与花瓣连生外, 完全分离, 游离花丝无毛; 子房有毛, 花柱无毛, 长1.6厘米, 顶端3浅裂, 裂片长2—2.5毫米。花期5月。

模式标本采自广东阳山县五元乡楠木塘, 分布到江西瑞金与福建长汀之间山地。



图版 51 1—3. 棱果毛蕊茶 *Camellia trigonocarpa* Chang; 1. 花枝, 2. 雄蕊, 3. 雌蕊及花柱。4—5. 小果毛蕊茶 *Camellia villicarpa* Chien; 4. 果枝, 5. 雌蕊。(蔡淑琴绘)