

圆形，萼片5，圆形，均有毛，花瓣5，有毛，先端圆；另一些具有尖萼，花瓣7片，先端尖的标本。台湾的标本则具有薄膜质的叶。

231. 文山毛蕊茶 图版 54: 1—5

Camellia wenshanensis Hu in Bull. Fan. Mem. Inst. Biol. Bot. **8**: 130. 1938; Sealy Rev. Gen. Camellia, 102. 1958; Chang l. c. 174. 1981.

灌木，高3.5米，嫩枝有柔毛。叶薄革质，卵状椭圆形，长4—6厘米，宽1.4—2.2厘米，先端渐尖，尖头钝，基部楔形，上面在中脉上有短毛，下面初时有柔毛，以后变秃或在中脉有毛，侧脉7—8对，在两面均不明显，边缘有细锯齿，叶柄长2—3毫米，有柔毛。花1—2朵腋生，几无柄；苞片4—5片，有毛；萼片5，阔卵形，长3—5毫米，先端钝，背面有毛；花瓣5片，倒卵形，长1厘米，背部有毛，基部连生；雄蕊比花瓣短，花丝管长为雄蕊全长的2/3，游离花丝有毛；子房3室，被柔毛，花柱有毛，先端3裂。蒴果未见。

模式标本采自云南文山，分布到贵州安龙。

本种非常接近心叶毛蕊茶 *C. cordifolia* (Metc.) Nakai，只是叶片较短小，尾部较短，花近无柄。

232. 广东毛蕊茶 图版 55: 4—8


Camellia melliana Hand.-Mazz. in Anz. Akad. Wiss. Math. Nat. Wien. **59**: 58. 1922; Sealy Rev. Gen. Camellia, 100, 1958; Chang Tax. Gen. Camellia 174. 1981; Chang et Bartholomew Camellias, 202. 1984.

灌木，多分枝，嫩枝有褐色茸毛。叶长圆披针形，薄革质，长3—5厘米，宽1—1.3厘米，先端渐尖而有一钝的尖头，基部圆形，上面干后深橄榄绿色，略有光泽，中脉多少有毛，下面黄褐色，被长丝毛，表皮有小瘤状突起，侧脉在上下两面均不明显，边缘密生细锯齿，叶柄长1—2毫米，有茸毛。花生枝顶叶腋，常与营养枝的芽体同时开放，花柄长2毫米，有茸毛；苞片4片，卵形，长0.5—1.5毫米，有长丝毛；萼片5片，阔卵形或近圆形，略尖，长约2—2.5毫米，背面多长茸毛；花冠白色，长约12毫米；花瓣5—6片，基部3毫米与雄蕊连生，最外侧2—3片，几乎完全离生，近圆形，先端略尖，长6—7毫米，近革质，背面有长茸毛，内侧3片倒卵形，先端尖或圆，近先端有毛；雄蕊长约1厘米，游离花丝有毛；子房有长丝毛，花柱长9毫米，有茸毛，先端3浅裂，裂片长1毫米，无毛。蒴果近球形，长1—1.2厘米，宽9—10毫米，先端有小尖突，基部有宿存萼片，被贴生长丝毛，或近于秃净，1室，种子1粒。

模式标本采自广东龙门与增城之间的三角山。

本种的枝、叶及花和果各部分都被毛，和心叶毛蕊茶 *C. cordifolia* (Metc.) Nakai 很接近，只是叶片较短小，花及果实亦较小。

233. 白毛蕊茶 图版 54: 6—8



图版 54 1—5. 文山毛蕊茶 *Camellia wenshanensis* Hu: 1. 植株, 2. 花, 3. 雄蕊, 4. 花柱及萼, 5. 花丝。6—8. 白毛蕊茶 *Camellia candida* Chang: 6. 花枝, 7. 雄蕊, 8. 花丝。(蔡淑琴绘)