

本种和长尾毛蕊茶 *C. caudata* Wall. 很接近, 但花较大, 长 3 厘米, 花丝管较长, 占雄蕊的 4/5。

237. 无齿毛蕊茶 图版 55: 1—3

***Camellia edentata*** Chang Tax. Gen. *Camellia* 178. 1981; Chang et Bartholomew *Camellias*, 205. 1984.

灌木, 嫩枝有灰色短柔毛。叶革质, 长圆形, 长 5—7.5 厘米, 宽 1.5—2.3 厘米, 先端渐尖, 基部楔形, 上面绿色, 干后灰绿色, 无光泽, 中脉有短柔毛, 下面同色, 无毛, 侧脉 10—12 对, 在上面多少可见, 在下面不明显, 全缘, 叶柄长 3—5 毫米, 有柔毛。花顶生及腋生, 花柄极短。苞片 5 片, 半圆形至卵圆形, 长 1—3 毫米, 有柔毛。萼片 5 片, 卵形, 几乎完全分离, 长 4—5 毫米, 有灰色柔毛, 先端尖。花瓣白色, 7 片, 长 1—1.2 厘米, 外侧 2 片近圆形, 长 8 毫米, 革质, 内侧 5 片呈倒卵圆形, 基部连生 2 毫米, 中部增厚, 革质, 边缘薄, 外侧均有灰色柔毛。雄蕊长 1 厘米, 花丝管长约 5 毫米, 游离花丝长 5 毫米, 有疏毛。子房有毛, 花柱有毛, 先端 3 浅裂。蒴果圆球形, 直径 1.5 厘米, 1 室, 有种子 1 粒。果片薄, 种子圆球形, 直径 1.2 厘米。花期 11—12 月。

模式标本采自广西田林老山, 海拔 1 350 米常绿林, 亦见于广东恩平。

238. 柳叶毛蕊茶 柳叶山茶 (中国高等植物图鉴)

***Camellia salicifolia*** Champ. ex Benth. in Hook. Kew. Journ. Bot. **3**: 309. 1851; Chang l. c. 179. 1981. — *Thea salicifolia* (Champ.) Seem. in Trans. Linn. Soc. **22**: 349. 1859. — *Thea salicifolia* var. *warburgii* Kochs in Engler Bot. Jahrb. **27**: 583. 1900. — *Camelliastrum salicifolium* (Champ.) Nakai in Journ. Jap. Bot. **16**: 701. 1940. — *Camellia salicifolia* var. *longisepala* Keng in Taiwania **1**: 233. 1950.

灌木至小乔木, 嫩枝纤细, 密生长丝毛。叶薄纸质, 披针形, 长 6—10 厘米, 宽 1.4—2.5 厘米, 有时更长, 先端尾状渐尖, 基部圆形, 上面干后带褐色, 无光泽, 沿中脉有柔毛, 下面有长丝毛, 侧脉 6—8 对, 在上下两面均能见, 边缘密生细锯齿, 叶柄长 1—3 毫米, 密生茸毛。花顶生及腋生, 花柄长 3—4 毫米, 被长丝毛; 苞片 4—5 片, 披针形, 长 4—10 毫米, 有长毛, 宿存; 萼片 5 片, 不等长, 线状披针形, 长 7—15 毫米, 基部宽 3—4 毫米, 宿存, 密生长丝毛。花冠白色, 长 1.5—2 厘米; 花瓣 5—6 片, 基部与雄蕊连生约 2 毫米, 倒卵形, 最外 1—2 片革质, 长 11—13 毫米, 背面有长毛, 内侧花瓣长 1.3—2 厘米, 有长丝毛; 雄蕊长 10—15 毫米, 花丝管长为雄蕊的 2/3, 分离花丝有长毛; 子房有长丝毛, 花柱有毛, 先端 3 浅裂。蒴果圆球形或卵圆形, 长 1.5—2.2 厘米, 宽 1.5 厘米, 1 室, 种子 1 粒, 果片薄。花期 8—11 月。

产广东、江西、湖南、台湾、福建及广西。模式标本采自香港。

本种的叶披针形, 多长毛, 苞片及萼片狭长披针形, 花瓣及花丝均被毛, 子房和花柱亦有毛, 易于识别。在缺乏花及果实时, 容易和心叶毛蕊茶 *C. cordifolia* (Metc.) Nakai



图版 55 1—3. 无齿毛蕊茶 *Camellia edentata* Chang: 1. 植株, 2. 蒴果, 3. 花。4—8. 广  
东毛蕊茶 *Camellia melliana* Hand.-Mazz.: 4. 花枝, 5. 花柱, 6. 花, 7. 蒴果, 8. 萼。

(谢庆建仿黄少容、黄锦添)