

柔毛；花瓣 5，倒卵形，长 2—2.5 厘米，外面有灰色绢毛；雄蕊无毛，长 1—1.2 厘米；子房被毛，3—5 室，花柱长 8 毫米，无毛。蒴果 3—5 室，椭圆形，长 3—4 厘米，有褐色茸毛；种子长 1.5—2 厘米。花期 6—7 月。

产贵州南部的三都、福建、湖南及广西。模式标本采自广东乳源半岭仔。

贵州标本被鉴定为斑枝石笔木 *T. maculatoclada* Li，其枝叶及果实特征基本上和本种是一致的。

12. 长萼石笔木 长毛石笔木（广东植物志）

Tutcheria wuiana Chang in Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni 6 (1): 29. 1960; Fl. Guangdong 2: 145. 1991.

乔木，高 8 米，嫩枝密生黄褐色长茸毛。叶革质，披针形，长 10—16 厘米，宽 3—4 厘米，先端渐尖，基部略圆，上面绿色，发亮，下面黄褐色，有茸毛，侧脉 12—15 对，在两面均隐约可见，网脉不明显，边缘有细锯齿，叶柄长 6—8 毫米，有茸毛。花生于枝顶叶腋，白色，直径 5—6 厘米，花柄长 1—1.2 厘米，粗壮，有毛；苞片卵圆形，长 1.2 厘米，有长茸毛；萼片卵形至披针形，革质，长 2—4 厘米，先端略尖，有长茸毛；花瓣长倒卵形，长 2.5—3 厘米，背面有毛；雄蕊长 1.5 厘米；子房 3 室，有毛，花柱长 1 厘米，无毛。蒴果三角锥形，长 3.5 厘米（未成熟），3 片裂开，每室有种子 2—3 个。花期 7—8 月。

模式标本采自广东罗定加益鸭刀大山，海拔 850 米的常绿林。分布到广西东南部。

本种的枝及叶被茸毛，叶片披针形，先端长渐尖，花柄长而粗壮，萼片长卵形，长达 4 厘米，易于识别。

13. 无柄石笔木（中山大学学报）

Tutcheria subsessiliflora Chang l. c. 22 (2): 105. 1983.

小乔木，高 5 米，嫩枝被褐色茸毛。叶革质，长圆形，长 7—11 厘米，宽 2.5—3.7 厘米，先端渐尖，基部楔形，上面干后橄榄绿色，发亮，下面被柔毛，侧脉 9—12 对，边缘有锯齿，叶柄长 1 厘米，有褐色茸毛。花腋生，近无柄；苞片阔卵形，长 4—5 毫米，被褐色茸毛；萼片短圆形或肾形，长 5—7 毫米，被褐色茸毛；花瓣淡黄色，长 1.2—1.5 厘米，背面有茸毛；雄蕊长 7—8 毫米；子房被茸毛，花柱长 6—8 毫米，先端 3—4 深裂或浅裂。花期 6 月。

模式标本采自云南马关老君山，海拔 1600 米的常绿林。

本种近似小果石笔木 *T. microcarpa* Dunn，但嫩枝及叶片密被茸毛，花较大；它和粗毛石笔木 *T. hirta* (Hand.-Mazz.) Li 的区别于花近无柄，较细小，萼片长 5—7 毫米，花瓣长 1.2—1.5 厘米。

14. 粗毛石笔木（广东植物志）

Tutcheria hirta (Hand.-Mazz.) Li in Journ. Arn. Arb. 26: 64. 1945. — *Gordo-*