

16. 尖喙石笔木 (中山大学学报)

Tutcheria rostrata Chang in Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni **26** (2): 106. 1983.

小乔木, 高 2 米, 嫩叶无毛。叶革质, 椭圆形, 长 9—14 厘米, 宽 3—5 厘米, 先端稍尖或钝, 基部楔形, 上面橄榄绿色, 有光泽, 下面黄绿色, 无毛, 侧脉 8—9 对, 边缘有钝齿, 叶柄长 1—1.8 厘米。蒴果三角锥形, 长 3 厘米, 宽 1.5 厘米, 先端尖喙, 基部圆, 喙长 7 毫米, 有 3 条纵沟, 3 片裂开, 果片厚 1.5 毫米, 每室有种子 1—2 个; 种子压扁, 长 1.5 厘米; 果柄长 1 厘米; 宿存萼片近圆形, 直径 6—7 毫米。

模式标本采自广东阳春河尾山一带。

本种和长柄石笔木 *T. greeniae* Chun 较接近, 但叶先端略钝, 果柄较长, 萼片较小, 蒴果先端有尖喙。

17. 薄叶石笔木 (中山大学学报)

Tutcheria tenuifolia Chang l. c. **22** (2): 108. 1983; Chang in Fl. Guangxi **1**: 802. 1991.

乔木, 高 13 米, 嫩枝有微毛。叶近膜质, 椭圆形, 长 9—13 厘米, 宽 3.5—4.5 厘米, 先端略尖, 尖头钝, 基部阔楔形, 上面干后暗灰色, 无光泽, 下面初时有稀疏粗毛, 不久变秃, 侧脉 10—13 对, 在两面均能见, 边缘有细锯齿, 叶柄长 6—8 毫米, 有微毛。花单生于叶腋, 细小, 花柄长 7—8 毫米, 有毛; 苞片 2, 卵形, 长 3—4 毫米, 有灰毛; 萼片 10, 薄革质, 圆形, 长 8—10 毫米, 有毛, 内面秃净; 花瓣白色, 长 1.5 厘米, 外面有毛; 雄蕊无毛; 子房 3 室, 被毛; 花柱长 6—7 毫米, 先端 3 裂。花期 6—7 月。

模式标本采自广西龙津大青山。

本种的叶片薄, 椭圆形, 花小, 花柄较长, 全体被灰毛。

18. 圆果石笔木 乌皮树 (台湾树木志)

Tutcheria shinkoensis (Hay.) Nakai in Journ. Jap. Bot. **15**: 708. 1940. — *Thea shinkoensis* Hayata in Journ. Coll. Sci. Tokyo **30**: 45. 1911. — *Camellia shinkoensis* (Hay.) Coh. St. in Meded. Proefat. Thee **40**: 68. 1916. — *Camellia shinkoensis* Makino in Journ. Jap. Bot. **1**: 92. 1918; Keng in Taiwania **1**: 229. 1950; H. L. Li Woody Fl. Taiwan 559. 1963. — *Pyrenaria shinkoensis* Keng in Gard. Bull. Singapore **26** (1): 134. 1972.

小乔木, 嫩枝初时有微毛, 以后变秃。叶薄革质, 长圆形, 长 9—12 厘米, 宽 2.5—4 厘米, 先端尖锐, 基部楔形, 上面发亮, 下面初时有稀疏微毛, 以后变秃, 侧脉 8—10 对, 在两面均能见, 边缘有细锯齿, 叶柄长 5—8 毫米。花单生于枝顶叶腋, 花柄长 3—4 毫米, 有毛; 苞片 2, 半圆形, 长 3 毫米, 宽 4.5 毫米, 有毛; 萼片 5, 圆形, 长 6—10 毫米, 有灰色绢毛; 花瓣 5 片, 白色, 倒卵形, 长 1.5 厘米, 背面有毛; 雄蕊长 7—9 毫米, 无毛。子房 3 室, 有毛, 花柱长 6 毫米, 无毛。蒴果近球形, 长 1.5—1.8 厘米,