

花直径 2 厘米…………… 21. 小花木荷 *S. parviflora* Cheng et Chang

1. 大萼木荷 (中山大学学报)

Schima macrosepala Chang in Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni **22** (3): 58. 1983.

乔木, 高 20 米, 嫩枝粗大, 宽 7 毫米, 被茸毛, 老枝有白色皮孔。叶革质, 椭圆形或长椭圆形, 长 23—26 厘米, 宽 7—9 厘米, 先端急短尖或钝, 基部阔楔形, 上面深绿色, 下面灰白色, 有柔毛, 侧脉 12—16 对, 网脉不明显, 全缘, 叶柄长 2—2.7 厘米, 有茸毛。花生于枝顶叶腋, 白色, 花柄长 3.5 厘米, 宽 5 毫米, 有灰黄色茸毛; 苞片 4 片, 1 对紧贴萼片, 1 对离萼片 7 毫米, 早落; 萼片圆卵形, 长 1—1.2 厘米, 先端略尖, 外面有灰黄色茸毛; 花瓣及雄蕊未见; 子房有茸毛, 花柱无毛。蒴果扁球形, 宽 2.7 厘米。花期 7—8 月。

模式标本采自云南河口四区苦竹寨, 海拔 1 500 米的山地常绿林。

这是本属里具有最大叶子的种, 叶椭圆形, 长达 26 厘米, 全缘, 有毛, 苞片 4 片, 萼片长达 1.2 厘米。

2. 多苞木荷 (中山大学学报)

Schima multibracteata Chang l. c. **22** (3): 59. 1983.

乔木, 嫩枝粗大, 无毛, 老枝灰白色。叶薄革质, 倒卵形, 长 11—16 厘米, 宽 4.5—7 厘米, 先端略尖, 基部楔形, 略下延, 上面干后浅绿色, 稍发亮, 下面灰白色, 无毛, 全缘, 侧脉 12—16 对, 在两面均能见, 叶柄长 1.5—2 厘米, 扁平。花 4—7 朵聚生于枝顶, 花柄长 1.5 厘米, 无毛; 苞片 4—5 片, 长 1.2—1.6 厘米, 外面有微毛, 其中 2 片紧贴萼片, 2 片离萼片 4—6 毫米; 萼片近圆形, 长 6 毫米, 有银白色绢毛; 花瓣白色, 最外 1 片背面有短毛, 其余 4 片仅在基部有绢毛; 雄蕊长为花瓣的一半; 子房有毛。蒴果未见。花期 8—9 月。

模式标本采自广西龙州。

本种近似银木荷 *S. argenta* Pritz., 但嫩枝无毛, 叶薄革质, 倒卵形, 无毛, 苞片 4—5 片, 长达 16 毫米, 萼片亦较大。

3. 多脉木荷 (中山大学学报)

Schima polyneura Chang l. c. **29** (2): 92. 1990.

乔木, 嫩枝有柔毛。叶厚革质, 长圆形或倒披针形, 长 12—15 厘米, 宽 3.5—5 厘米, 先端渐尖或锐尖, 尖头略钝, 基部窄楔形, 下延, 上面干后绿色, 有光泽, 下面红褐色, 初时有红褐色柔毛, 以后变秃净, 仅在基部及中脉上有毛; 侧脉 13—18 条, 干后在上下两面均明显, 网脉略能见; 全缘, 叶柄长 1—2.5 厘米, 有微毛。花顶生, 花柄长约 1—1.5 厘米, 被微毛, 以后变秃; 大苞片 2, 生花柄基部, 长倒卵形, 长约 1 厘米, 被柔毛; 苞片 2, 生花柄顶端, 倒卵状长圆形, 长约 1 厘米, 被柔毛; 萼片 5, 近圆形, 长 4 毫米, 被毛; 花瓣未见; 子房被毛。蒴果近球形, 直径 1.5 厘米。