

模式标本采自广西大瑶山。

本种与毛木荷 *S. villosa* Hu 的区别在于叶片较厚，下面红褐色，无毛，萼片较小，苞片较大，蒴果较小。

#### 4. 毛木荷 图版 60: 2—3

*Schima villosa* Hu in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. Bot. ser. 8: 141. 1938.

乔木，高 7 米，嫩枝近方形，有绢毛，老枝粗大，有灰白皮孔。叶薄革质，长圆形或披针形，长达 18 厘米，宽 6 厘米，先端渐尖，基部楔形，上面发亮，中脉上有毛，下面被灰色绢毛，侧脉 14—16 对，以 45° 开角斜向上，全缘，叶柄长约 2 厘米，有茸毛。花单生于枝顶叶腋，白色，直径 4 厘米，花柄粗大，长 2 厘米，有毛；苞片 2，卵形，长 7 毫米，有绒毛；萼片圆形，长 7 毫米，外面有毛；花瓣近圆形，长 2.5 厘米，外面基部有毛；雄蕊长 1 厘米，花丝无毛；子房密生绢毛，花柱粗大，略有毛，长 11 毫米，先端 5 裂。蒴果直径 2.5 厘米。花期 7 月。

模式标本采自云南金屏。

本种接近银木荷 *S. argentea* Pritz.，只是叶较大，叶背多毛，叶脉较多，花萼稍大。

#### 5. 南洋木荷 滇木荷（中国高等植物图鉴）

*Schima noronhae* Reinw. ex Bl. Bijdr. 130. 1825; Miq. Fl. Nederl. Ind. 1 (2): 402. 1859; Ridl. Fl. May. Penins. 1: 201. 1922; Gagnep. in Suppl. Fl. Gen. Indo-Chine 1: 329. — *Gordonia javanica* Rollis ex Hook. Bot. Mag. t. 4539. 1850.

乔木，嫩枝无毛。叶革质，长圆形，长 7—11 厘米，宽 3—4.5 厘米，先端渐尖或锐尖，基部楔形，有时阔楔形，上下两面均无毛，侧脉 8—10 对，全缘，叶柄长 1—1.7 厘米，稍纤细。花 4—7 朵生枝顶，呈伞房状，花柄长 3—6 厘米，无毛，稍纤细；苞片 2，生于花柄上部，早落；萼片近圆形，长 5—6 毫米，多少被毛；花瓣长约 1.5 厘米，最外 1 片兜状，被毛；雄蕊比花瓣短；子房被毛。蒴果近圆形，直径约 1.5 厘米，5 片裂开，种子长 6—7 毫米。花期 8—9 月。

产云南西南部。分布于印度尼西亚、马来西亚、缅甸、老挝、泰国、越南。

本种和银木荷 *S. argentea* Pritz. 很接近，但花柄长 3—6 厘米，萼片较大，嫩枝无毛。

#### 6. 银木荷（中国高等植物图鉴） 图版 59: 3—4

*Schima argentea* Pritz. ex Diels in Engl. Jahrb. 29: 473. 1900; Icon. Cormophyt. Sin. 2: 860. — *Schima mairei* Hochr. in Ann. Conserv. et Jard. Bot. Geneve 20: 190. 1917.

乔木，嫩枝有柔毛，老枝有白色皮孔。叶厚革质，长圆形或长圆状披针形，长 8—12 厘米，宽 2—3.5 厘米，先端尖锐，基部阔楔形，上面发亮，下面有银白色蜡被，有柔毛或秃净，侧脉 7—9 对，在两面明显，全缘；叶柄长 1.5—2 厘米。花数朵生枝顶，直径



图版 60 1. 小花木荷 *Schima parviflora* Cheng et ex Chang Chang.

2—3. 毛木荷 *Schima villosa* Hu; 2. 植株, 3. 蒴果。(黄锦添绘)