

明显，在下面突起，边缘有尖锐锯齿，叶柄长 1.5—2 厘米。花单生于枝顶叶腋，白色，直径 6 厘米；花柄长 2—2.5 厘米，有微毛；苞片 2 片，卵形，长 1—1.2 厘米，无毛，紧贴在萼片下，苞着花蕾；萼片近圆形，长 4—5 毫米，花瓣倒卵圆形，长 2.5—3 厘米；雄蕊长 1—1.5 厘米；子房有毛。蒴果直径 2—3 厘米。 花期 6—7 月。

产云南腾冲。分布于印度。

14b. 尖齿毛木荷（变种）

var. *sericans* Hand. -Mazz. in Symb. Sin. 7 (1—2): 396. 1929.

嫩枝有毛。叶薄革质或近膜质，椭圆形，长 9—13 厘米，宽 5—6.5 厘米，两端尖，下面有短柔毛；侧脉 7—12 对，边缘有锐利锯齿。蒴果球形，宽 2.2 厘米；萼片半圆形，长 4 毫米。

模式产云南西部临沧。

15. 拟钝齿木荷（中山大学学报）

Schima paracrenata Chang in Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni 22 (3): 61. 1983.

乔木，顶芽有灰白色茸毛，嫩枝近秃净。叶薄，近膜质，长圆形，长 11—16 厘米，宽 4.5—5.5 厘米，先端渐尖，基部阔楔形，稍下延，上面干后稍暗晦，下面无毛，侧脉 12—15 对，与网脉在两面均明显，边缘有钝齿，叶柄长 2 厘米。花单生于枝顶叶腋，直径 5 厘米，白色，花柄长 4 厘米，较纤弱，无毛；苞片 2，长 1 厘米，早落；萼片半圆形，长 2—2.5 毫米，外面无毛，边缘有睫毛；花瓣长 2.5—3 厘米，最外 1 片风帽状，外面下半部有灰茸毛；雄蕊长 1—1.3 厘米，离生；子房有灰茸毛。 花期 7—8 月。

模式标本采自云南贡山独龙江，海拔 2 100 米的森林里。

本种与钝齿木荷 *S. crenata* Korth. 的区别在于花较大，萼片较小，叶脉较多；它和尖齿木荷 *S. khasiana* Dyer 的区别在于叶具钝齿，花柄较长，萼片较小。

16. 钝齿木荷

Schima crenata Korth. Verb. Nat. Gesch. Bot. 29: 143; Miq. Fl. Ind. Bat. 1: 491. 1859; Pitard in Lecomte Fl. Gen. L'Indo-Chine 1: 351. 1910; Gagnepain in Supplement 1: 326. 1943.

乔木，高 20 米，树皮厚 1—1.5 厘米，不规则裂开，嫩枝有微毛，旋变秃净。叶革质，长圆形，长 7—12 厘米，宽 3—4.4 厘米，先端渐尖，基部楔形，下延，上面干后绿色，不发亮，下面黄绿色，无毛；侧脉 6—7 对，与网脉在上下两面均能见；边缘有波状钝齿，叶柄长 1.5—2.5 厘米。花白色，生枝顶叶腋，直径约 3 厘米，花柄长 4—5 厘米，略有微毛；苞片 2，位于萼片之下，早落；萼片 5，短圆形，长约 4 毫米，宽 5 毫米，先端圆，有微毛，内侧有贴生丝毛，突出成睫毛；花瓣 5，阔倒卵圆形，长 1.5 厘米，外侧近秃净，内侧有贴生丝毛；雄蕊不等长，长 5—8 毫米，花丝分离；子房 5 室，被茸毛，花柱长 6—7 毫米。蒴果近圆球形，直径 1.6—2 厘米。