

Gardn. et Champ. 的区别在于嫩枝有毛, 叶片狭窄, 长圆形, 下面有柔毛, 花柄纤细。

5. 圆籽荷属 *Apterosperma* Chang

Chang in Act. Sci. Nat. Univ. Sunyatseni **15** (2): 90, 1976; Chang in Fl. Guangdong **2**: 150. 1991.

小乔木。叶革质, 互生, 多列, 边缘具锯齿, 有叶柄。花小, 两性, 排列成总状花序, 有短花柄; 苞片 2, 早落, 细小; 萼片 5, 覆瓦状排列, 宿存; 花瓣 5, 白色, 倒卵形, 覆瓦状排列, 最外 1 片不呈风帽状; 雄蕊多数, 排成 2 列, 外轮稍长, 花丝扁平, 离生; 花药 2 室, 基部叉开, 直裂, 基部着生; 子房上位, 5 室, 花柱极短, 或缺, 柱头 5 裂; 胚珠每室 3—4 个, 着生于中轴胎座中部。蒴果扁球形, 沿室背 5 片裂开。中轴宿存, 每室有种子 2—3 粒; 种子肾圆形, 无翅, 背面厚而突起, 种脐短, 胚乳缺。

本属模式种: *Apterosperma oblata* Chang

1 种, 分布于广东西部及广西东南部。

本属与木荷属 *Schima* 很接近, 但花小, 雄蕊仅 2 列, 花药基部叉开, 无花柱, 胚珠少数, 蒴果扁球形, 种子无翅。

1. 圆籽荷 (中山大学学报) 图版 62: 1—7

Apterosperma oblata Chang in Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni **2**: 91. 1976; Chang in Fl. Guangdong, **2**: 150. 1991.

灌木至小乔木, 高 3—10 米, 嫩枝有柔毛, 老枝变秃, 干后黑褐色。叶聚生于枝顶, 革质, 狭椭圆形或长圆形, 长 5—10 厘米, 宽 1.5—3 厘米, 先端渐尖, 基部楔形, 上面深绿色, 下面初时有柔毛, 以后变秃; 侧脉 7—9 对, 靠近边缘弯曲相结合, 在两面均明显, 边缘有锯齿; 叶柄长 3—6 毫米, 有毛。花浅黄色, 直径 1.5 厘米, 顶生或腋生, 有花 5—9 朵排成总状花序, 花柄长 4—5 毫米, 有毛; 苞片细小, 紧贴于花萼下, 早落; 萼 5 片, 阔卵形, 长 4 毫米, 先端圆, 基部近离生, 有毛; 花瓣 5 片, 基部连生, 阔倒卵形, 长 7 毫米, 宽 6 毫米, 背面有毛; 雄蕊 22—24 个, 长 4—5 毫米, 花药 2 室, 基部叉开; 子房圆锥形, 基部有毛, 5 室, 每室有胚珠 3—4 个, 花柱极短, 先端 5 浅裂。蒴果扁球形, 宽 8—10 毫米, 高 5—6 毫米, 5 片裂开, 中轴长 5 毫米, 种子褐色, 长 4 毫米, 厚 1.5 毫米, 无翅。花期 5—6 月。

模式标本采自广东阳春河尾山, 分布到广东信宜、恩平和广西桂平等地。

族 III. 紫茎族 Trib. STEWARTIEAE (Airy-Shaw) Chang