

侧被丝毛；雄蕊多数，花丝基部合生；子房有稀疏柔毛或秃净；花柱长6—8毫米，先端5裂。

产湖南的西南部，模式标本采自紫云山。

近似红皮紫茎 *S. rubiginosa* Chang，但叶片较狭窄，下面被贴生柔毛，子房近于秃净。

10. 云南紫茎

Stewartia yunnanensis Chang in Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni **21** (4): 77. 1982.

小乔木，嫩枝有茸毛。叶薄革质或近膜质，椭圆形，长8—14厘米，宽3.5—5厘米。先端急短尖，基部楔形，上面沿中脉有毛，下面有柔毛，侧脉6—7对，边缘有细钝齿，叶柄长6—8毫米。花腋生，白色，花柄长2—3毫米，有茸毛；苞片三角形，长4.5毫米；萼片长卵形，长1—1.4厘米，有毛；花瓣倒卵形，长1厘米，有毛；雄蕊长7毫米；子房有茸毛，花柱5条，离生，长5—6毫米。花期4—5月。

模式标本采自云南西双版纳勐宋，海拔1800—2000米的常绿林内。

它是国产种类中唯一的具有离生花柱的种类，也是亚洲紫茎区系里唯一的代表。另一种离生花柱的种是北美产的 *S. ovata* Weatherby。

族Ⅳ. 核果茶族 Trib. PYRENARIEAE Chang

Chang in Claves Fam. Gen. Cormophyt. Sin. 279. 1987.

萼片5—10片，花瓣5—10片，雄蕊多数，子房3—5(7)室，核果，不开裂，无中轴。

本族有2属，分布于亚洲热带，我国2属均产。

8. 多瓣核果茶属 *Parapyrenaria* Chang

Chang in Acta Phytotax. Sin. 8: 287. 1967.

乔木。叶革质，长圆形，边缘有锯齿，有叶柄。花单生于枝顶叶腋，近无柄。苞片2，脱落。萼片厚革质，8—10片，由外向内逐渐增大，并过渡为花瓣，花开后脱落，花瓣8—10片，黄色，基部略相连生，外面与萼片及苞片同样有绢毛；雄蕊多数，排成5—7列；花丝基部与花瓣连生，花药2室，背部着生，侧裂；子房上位，3室；花柱合生，柱头3枚，顶端稍扩大；胚珠每室2—3个，着生于中轴胎座。果实核果状，不裂开，橄榄形，果皮肉质，干后近木质。种子每室2—3个，长椭圆形；种皮骨质，种脐伸长；胚乳不存在；子叶肉质，沿纵向折曲。

本属模式种：*P. multisepala* Chang