

2 种，产海南省。越南有分布。

本属与核果茶属 *Pyrenaria* 的区别在于后者萼片及花瓣均 5 数，心皮亦常为 5 数，花柱离生，核果有宿存萼片。

1. 多瓣核果茶 图版 69

Parapyrenaria multisejala (Merr. et Chun) Chang in Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni 18 (3): 74. 1974. — *Tutcheria multisejala* Merr et Chun in Sunyatsenia 2: 41, 1934; H. H. Hu in Fl. Hainan. 1: 496. 1964. — *Parapyrenaria hainanensis* Chang in Aata Phytotax. Sin. 8: 288. 1963. — *Pyrenaria multisejala* (Merr. et Chun) Keng in Gard. Bull. Singapore. 26 (1): 134. 1972.

乔木，高 7—12 米，嫩枝被柔毛。叶革质，长圆形或倒披针形，长 9—14 厘米，宽 2.5—4.5 厘米，先端尖锐，尖头钝，基部狭楔形，上面干后黄绿色，发亮，下面初时有银灰色绢毛，以后变秃；侧脉 9—11 对，在上面明显，在下面突起，边缘有锯齿，叶柄长 6—8 毫米。花生于近顶端的叶腋，无柄，直径 3.5—4.5 厘米，黄色；苞片肾形，长 2 毫米，宽 3.5 毫米，外面有贴生柔毛，内面无毛；萼片 8—10 片，最外侧的肾形，长 5—7 毫米，宽 6—8 毫米，内侧的阔卵形，长 8—10 毫米，宽 10—12 毫米，外面有绢毛；花瓣 8—10 片，阔卵形至倒卵形，革质，长 12—20 毫米，外面有绢毛，先端 2 浅裂；雄蕊黄色，长约 1 厘米；子房被茸毛，3 室；花柱单一，长 9—12 毫米，有毛，柱头 3 枚。核果长 3—3.5 厘米，宽 2—2.5 厘米，两端圆，有毛，果皮厚 5—6 毫米。种子每室 1—3 个。

花期 5—6 月。

模式标本采自海南尖峰岭，常见于南部海拔 800 米的常绿林。

9. 核果茶属 *Pyrenaria* Bl.

Bl. in Bijdr. 1119, 1828; Benth. et Hook. Gen. Pl. 1: 185, 1862. —

Sinopyrenaria Hu in Act. Phytotax. Sin. 5: 281. 1956.

常绿乔木。叶革质，长圆形，羽状脉，有锯齿，具柄。花白色或黄色，单生于枝顶叶腋，有短柄；苞片 2，有时叶状，早落；萼片 5 (6)，卵形或叶状，常宿存；花瓣 5 (6)，基部连生；雄蕊多数，基部与花瓣连生，花药 2 室，背部着生；子房 5 室，有时 6—7 室，每室有胚珠 2—3 个，着生于中轴胎座；花柱 5 数，离生，或部份合生。核果，不开裂，内果皮骨质；种子长圆形，种皮坚硬骨质，无胚乳，子叶大。

本属模式种：*Pyrenaria serrata* Bl.

约 20 种，分布于东南亚及中国热带地区。我国有 7 种，产云南及广西。

分种检索表

1. 核果长筒形或椭圆形, 嫩枝及叶片常被毛。
 2. 核果大, 长达 7 厘米, 叶基部心形 1. 长核果茶 *P. oblongicarpa* Chang
 2. 核果长 2—4 厘米, 叶基部楔形。
 3. 苞片或萼片叶状, 长 1—1.4 厘米, 有脉纹, 叶长 9—14 厘米 2. 云南核果茶 *P. yunnanensis* Hu
 3. 苞片及萼片短小, 不呈叶状。
 4. 萼片长 8—10 毫米, 叶长 6—9 厘米 3. 短叶核果茶 *P. garretiana* Craib
 4. 萼片长 5—6 毫米, 叶长 10—13 厘米 4. 短萼核果茶 *P. brevisepala* Chang
1. 核果近球形, 嫩枝及叶无毛或有毛。
 5. 苞片及萼片呈叶状, 叶片有侧脉 9—11 对 5. 景洪核果茶 *P. cheliensis* Hu
 5. 苞片及萼片不呈叶状, 侧脉 12—20 对。
 6. 叶倒披针形, 长 12—18 厘米, 核果扁球形, 宽 2 厘米 6. 西藏核果茶 *P. tibetana* Chang
 6. 叶倒卵形, 长 20—30 厘米, 核果球形, 宽 5—6 厘米 7. 勐腊核果茶 *P. menglaensis* Tao

1. 长核果茶 (中山大学学报)

Pyrenaria oblongicarpa Chang in Act. Sci. Nat. Univ. Sunyatseni **22** (3): 62. 1988.

乔木, 高 10 米; 嫩枝有茸毛。叶革质, 倒卵形, 长 15—24 厘米, 宽 8—10 厘米, 先端急锐尖, 基部窄圆稍呈心形, 上面橄榄绿色, 发亮, 下面有短柔毛, 侧脉 11—13 对, 边缘有锯齿, 叶柄长 6—8 毫米。花未见, 核果长椭圆形, 长 7 厘米, 宽 3.5 厘米, 先端略尖, 5 室, 果皮木质, 厚 4—5 毫米, 被毛, 有 5 条浅纵沟; 种子每室 2 个, 上下叠置, 长 2.5—3 厘米, 褐色, 种脐伸长。

模式标本采自云南、屏边、瑶山区白岩乡老龙田村王围冲。

本种具有国产种类中最大的叶片, 最大的核果。

2. 云南核果茶 图版 70: 1—5

Pyrenaria yunnanensis Hu in Bull. Fan. Mem. Inst. Biol. Bot. **8**: 137, 1938. —
Sinopyrenaria yunnanensis Hu in Acta Phytotax. Sin. **5**: 281, 1956. —*Stewartia longibracteata* Chang in Act. Sci. Nat. Univ. Sunyatseni **21** (4): 76—77.

乔木, 嫩枝有黄褐色茸毛。叶薄革质, 狭长椭圆形, 长 9—14 厘米, 宽 3—5.5 厘米, 先端尖锐, 基部楔形, 上面干后橄榄绿色, 发亮, 下面有褐色柔毛, 侧脉 6—10 对, 与网脉在上面能见, 在下面突起, 边缘有细锯齿, 叶柄长 1 厘米, 有柔毛。花单生于枝顶叶腋, 花柄长 6 毫米, 有毛; 苞片 2, 卵状三角形, 长 3—20 毫米, 宽 2—8 毫米, 有脉