

5 条，长 4—5 毫米。核果圆球形，直径 2.5—3 厘米，基部收窄，有短的子房柄，顶端凹陷，有 5 条纵沟；种子长 1.3 厘米，发亮，宿存萼片长 1 厘米，宽 6 毫米，外面被毛，果柄长 7 毫米。 花期 3 月。

模式标本采自云南西双版纳大猛龙南糯山，常绿林内。

本种近似云南核果茶 *P. yunnanensis* Hu，但核果球形。

6. 西藏核果茶（西藏植物志）

Pyrenaria tibetana Chang in Act. Sci. Nat. Univ. Sunyatseni, **22** (2): 64, 1983; Fl. xizangica, **3**: 263. 1986.

乔木，高 13 米，嫩枝无毛。叶革质，倒披针形，长 12—18 厘米，宽 3—6 厘米，先端急锐尖，基部楔形，上面暗晦，下面无毛，黄绿色，侧脉 12—15 对，边缘有浅齿，叶柄长 1—1.5 厘米。花有短柄；萼片近圆形，长 8—9 毫米，被毛；花瓣长 1 厘米；雄蕊长 6 毫米，离生；子房 5 室，被毛；花柱 5 条，离生。核果扁球形，直径 2 厘米，顶端凹入，5 室；外果皮肉质，厚 4—6 毫米；内果皮骨质；每室有种子 1 个；种子扁长圆形，长 6—8 毫米。 花期 7—8 月。

模式标本采自西藏墨脱东地站西北坡，海拔 2 000 米的山地常绿林。

本种是国产中唯一的枝及叶秃净无毛的种，核果扁球形，易于区别。

7. 勐腊核果茶（云南植物研究）

Pyrenaria menglaensis Tao in Act. Bot. Yunnan. **5** (2): 183, f. 1, 1983.

乔木，高 15 米；嫩枝被褐色粗毛。叶薄革质，长倒卵形，长 20—30 厘米，宽 9—14 厘米，先端圆或钝，基部楔形，上面暗绿色，下面被柔毛，侧脉 16—20 对，干后在上面能见，在下面突起，网脉明显，边缘上半部有细锯齿；叶柄长约 1 厘米，被柔毛。花生枝顶叶腋，白色，花柄长 5—8 毫米，被粗毛；苞片 2，卵形，生于花柄基部，长 1 厘米，被茸毛；萼片 5，阔卵形，长 1.5 厘米，被茸毛；花瓣 5，阔倒卵形，长 2.5—3 厘米，外侧被灰茸毛；雄蕊长 1—1.5 厘米；子房 5 室，被茸毛；花柱 5 条，离生，长 8 毫米。核果球形，直径 5—6 厘米，5 室；种子每室 2—3 个，具宿存萼片。 花期 10 月。

模式标本采自云南西双版纳勐腊，常绿林中。

本种具有最大的叶片，侧脉多达 20 对，核果大，圆球形，易于识别。