

明显或微凸起；顶生羽片倒卵形或菱状卵形，2叉或3叉状，长10—13厘米，宽6—10厘米。叶为纸质，两面光滑；叶轴腹面有纵沟，疏生披针形及线形棕色鳞片。孢子囊群遍布羽片背面；囊群盖圆形，盾状，边缘有小齿。

产湖北西部、湖南（怀化）、四川、贵州（清镇、梵净山）、西藏（察隅）。多生于阔叶林下，草地也有，海拔700—2500米。模式标本采自四川峨眉。

23. 线羽贯众（植物分类学报） 柳叶贯众（植物分类学报） 图版 58: 3—4

*Cyrtomium urophyllum* Ching in Bull. Chin. Bot. Soc. 2 (2): 101. 1936; Shing in Acta Phytotax. Sinica Addit. I: 30. 1965; P. S. Wang, Pterid. Fanjin 112. 1992. — *C. salicipinnum* Ching et Shing ex Shing l. c. 31. 1965.

植株高50—100厘米。根茎直立，密被披针形棕色鳞片。叶簇生，叶柄长24—48厘米，基部直径3—5毫米，禾秆色，腹面有浅纵沟，下部密被卵形及披针形棕色鳞片，鳞片边缘有齿，向上部渐秃净；叶片矩圆披针形，长34—70厘米，先端钝，基部略变狭，奇数一回羽状；侧生羽片8—13对，互生，斜向上，有短柄，线状披针形，中部的长9—20厘米，宽1.5—2.5厘米，先端渐尖成尾状，基部楔形，边缘全缘或上部有小齿；具羽状脉，小脉联结成多行网眼，腹背两面均不明显或微凸起；顶生羽片倒卵形或菱状卵形，2叉或3叉状，长6—10厘米，宽4—9厘米。叶为纸质，两面光滑，囊群着生处叶腹面常凸出、背面下凹成小穴；叶轴腹面有纵沟，疏生披针形及线形棕色鳞片。孢子囊群遍布羽片背面；囊群盖圆形，盾状，边缘有小齿或近全缘。

产湖南（靖县、雪峰山）、广西（龙胜）、四川（峨眉、大相岭、雷波、屏山）、贵州（梵净山）、云南（绥江）。生常绿阔叶林下，溪边，海拔600—1650米。模式标本采自四川峨眉山。

24. 台湾贯众（植物分类学报） 台湾贯众蕨（台湾植物志） 图版 57: 5

*Cyrtomium taiwanense* Tagawa in Acta Phytotax. Geobot. 7: 78. 1938; Shnig in Acta Phytotax. Sinica Addit. I: 31. 1965; W. C. Shieh in H. L. Li et al. Fl. Taiwan 1: 371. 1975; W. C. Shieh et al. in T. C. Huang, Fl. Taiwan 2 ed. 1: 302. 1994.

根茎未见。叶柄长25厘米，禾秆色，疏生纤毛状和近全缘的披针形棕色鳞片；叶片矩圆形长约30厘米，宽约15厘米，奇数一回羽状；侧生羽片6—7对，互生，略斜向上，有短柄。矩圆披针形，下部的长12—15厘米，宽2.5—3厘米，先端渐尖，基部宽楔形至楔形，边缘有前倾的小齿；叶脉背面明显，小脉联结成约5行网眼；顶生羽片矩圆形，长约10厘米，不分裂。叶为纸质；叶轴疏生纤毛状鳞片。孢子囊群成不规则的5—6行，囊群盖圆形，中间隆起，边缘全缘。

产台湾（台东）。模式标本采自台湾台东。

25. 宽镰贯众（植物分类及植物地理） 图版 59: 4

*Cyrtomium latifolium* S. K. Wu et Mitsuta in Acta Phytotax. Geobot. 36 (1—3): 22. f. 1. 1985.

植株高20—30厘米。根茎直立，密被披针形棕色鳞片。叶簇生，叶柄长10—12厘米，基部直径2—3毫米，禾秆色，腹面有浅纵沟，基部密生卵形及披针形棕色及黑棕色鳞片，鳞片边缘有齿，向上秃净；叶片宽披针形，长17—22厘米，宽6—9厘米，先



图版 57 1—2. 斜方贯众 *Cyrtomium trapezoideum* Ching et Shing: 1. 叶, 2. 囊群盖。3—4. 尖羽贯众 *Cyrtomium hookerianum* (Presl) C. Chr.: 3. 中部羽片, 4. 上部羽片。5. 台湾贯众 *Cyrtomium taiwanense* Tagawa: 1 羽片。(陈笈绘)