

端急尖，基部略变狭，奇数一回羽状；侧生羽片 5—8 对，互生近平伸，有短柄，偏斜的卵形并向上弯、少为宽披针形，中部的长 4.5—5.5 厘米，宽 2—3 厘米，先端渐尖，基部偏斜上侧近截形下侧圆楔形，边缘有不明显的小钝齿；具羽状脉，小脉联结成 3—4 行网眼，腹面不明显，背面微凸起；顶生羽片宽卵形，下部二叉或三叉状，长 6—7 厘米，宽 3—5 厘米。叶为纸质，两面秃净；叶轴腹面有浅纵沟，有线形的棕色鳞片或秃净。孢子囊群遍布羽片背面；囊群盖未见。

产云南（西双版纳）。生海拔 550—620 米。模式标本采自云南西双版纳。

26. 贯众（植物分类学报） 图版 59: 1—2


Cyrtomium fortunei J. Sm. Ferns Brit. & Fore, 286. 1866 et Hist. Fil. 205. 1875; C. Chr. in Amer. Fern Journ. **20** (2): 49. 1930; Tagawa in Acta phytotax. Geobot. **3** (2): 61. f. 2 (5—6) 1934; Ching, Ic. Fil. Sin. **3**: pl. 126. 1935 et in Bull. Chin. Bot. Soc. **2** (2): 102. 1936; Ogata, Ic. Fil. Jap. **8**: pl. 367. 1940; Tard.-Blot et C. Chr. in Fl. Indo-Chine **7**(2):378. 1941; H. Ito, Fil. Jap. Ill. t. 318. 1944; 傅书遐, 中国主要植物图说·蕨类植物门 194. 图 261. 1957; Tagawa, Col. Ill. Jap. Pterid. **84**. 197. pl. 28. f. 163. 1959; Kurata in Sci. Rep. Yokosuka City Mus. **8**:33. 45. 1963; Shing in Acta Pytotax. Sinica Addit. **I**:24. 1965; Ic. Corm. Sin. **1**:227. f. 454. 1972; Fl. Tsinling **2**:150. 1974; Nakaike, N. Fl. Jap. Pterid. **354**. 1982; Fl. Fukien **1**:183. f. 171. 1982; Kurata et Nakaike, Ill. Pterid. Jap: **5**:576. 1987; Tagawa et Iwatsuki, Fl. Thail. **3**(3):332. 1988; 李建秀, 山东植物志, 上:129. 图 69. 1990; Shing in J. F. Cheng et G. F. Zhu, Fl. Jiangxi **1**:239. f. 302. 1993; X. Cheng in W. T. Wang, Vasc. Pl. Hengduan Mts. **1**:146. 1993; C. F. Zhang, Fl. Zhejiang **1**:212. f. 1—223. 1993. ———*Aspidium falcatum* var. *fortunei* (J. Sm.) Baker ex Makino in Bot. Mag. Tokyo **10**: 212. 1896. ———*Polystichum falcatum* var. *fortunei* Matsum. Ind. Pl. Jap. **1**: 342. 1904; 伊藤武夫, 台湾植物图说, 续卷 68. 1928. ———*P. fortunei* (J. Sm.) Nakai in Bot. Mag. Tokyo **39**: 116. 1925.

26a. 贯众（原变型）

f. *fortunei*

植株高 25—50 厘米。根茎直立，密被棕色鳞片。叶簇生，叶柄长 12—26 厘米，基部直径 2—3 毫米，禾秆色，腹面有浅纵沟，密生卵形及披针形棕色有时中间为深棕色鳞片，鳞片边缘有齿，有时向上部秃净；叶片矩圆披针形，长 20—42 厘米，宽 8—14 厘米，先端钝，基部不变狭或略变狭，奇数一回羽状；侧生羽片 7—16 对，互生，近平伸，柄极短，披针形，多少上弯成镰状，中部的长 5—8 厘米，宽 1.2—2 厘米，先端渐尖少数成尾状，基部偏斜、上侧近截形有时略有钝的耳状凸、下侧楔形，边缘全缘有时有前倾的小齿；具羽状脉，小脉联结成 2—3 行网眼，腹面不明显，背面微凸起；顶生羽片狭卵形，下部有时有 1 或 2 个浅裂片，长 3—6 厘米，宽 1.5—3 厘米。叶为纸质，两面光滑；叶轴腹面有浅纵沟，疏生披针形及线形棕色鳞片。孢子囊群遍布羽片背面；囊群盖圆形，盾状，全缘。

产河北（南五台）、山西南部（晋城）、陕西、甘肃南部、山东、江苏、安徽、浙



图版 59 1—2. 贯众 *Cyrtomium fortunei* J. Sm.: 1. 叶, 2. 囊群盖。3. 小羽贯众 *Cyrtomium fortunei* J. Sm. form. *Polypterum* (Diels) Ching: 一段叶。4. 宽镰贯众 *Cyrtomium latifoliatum* S. K. Wu et Mitsuta: 羽片。5—7. 福建贯众 *Cyrtomium conforme* Ching: 5. 羽片背面, 6. 羽片腹面, 7. 囊群盖。

(陈笈绘, 4 仿武素功与光田重辛)