

江、江西、福建、台湾、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。生空旷地石灰岩缝或林下，海拔 2400 米以下。也分布于日本、朝鲜南部、越南北部、泰国。

K. Iwatsuki (1988) 曾报道本种在尼泊尔有分布，作者未见其标本同时也没有详细的记载，但这是可能的。

26b. 小羽贯众 (变型) 图版 59: 3

f. *polypterum* (Diels) Ching, Ic. Fl. Sin. 3: pl. 126. f. 3. 1935 et Bull. Chin. Bot. Soc. 2 (2): 104. 1936; Shing in Acta Phytotax. Sinica Addit. I: 27. 1965; Fl. Tsinling 2: 150. 1974; 丁宝章等, 河南植物志 1: 87. 1981. — *Polystichum falcatum* Diels var. *polypterum* Diels in Engl. Bot. Jahrb. 29: 195. 1900. — *Cyrtomium falcatum* Presl var. *polypterum* (Diels) C. Chr. in Acta Hort. Gothob. 1: 72. 1924. — *C. recurvum* Ching et Shing ex Shing l. c. 20. 1965.

羽片较小，长 2—3 厘米，宽 0.6—1 厘米，较多，16—32 对。

产山西 (晋城)、陕西 (秦岭地区)、甘肃 (天水)、江西 (修水)、河南 (卢氏)、湖北西部、湖南西部、四川 (平武、峨眉)、重庆 (南川、奉节)、贵州 (梵净山、遵义)。生阴湿处石缝内，海拔 500—2120 米。模式标本采自重庆南川。

26c. 宽羽贯众 (变型)

f. *latipinna* Ching, Ic. Fl. Sin. 3: pl. 126. f. 2. 1935 et Bull. Chin. Bot. Soc. 2 (2): 104. 1936 excl. syn.; Shing in Acta Phytotax. Sinica Addit. I: 27. 1965; 丁宝章等, 河南植物志. 1: 81. 1981; C. F. Zhang, Fl. Zhejiang 1: 213. 1993.

羽片卵状披针形，长 6—9 厘米，宽 2—3 厘米。

产山西、安徽、浙江、江西、河南、四川、贵州。生石缝内，海拔 650—2400 米。

27. 山东贯众 (植物分类学报)

*Cyrtomium shandongense* J. X. Li in Bull. Bot. Res. 4 (2): 142. pl. 1. 1984; 李建秀, 山东植物志, 上: 129. 图 68. 1990.

植株高 20—35 厘米。根茎直立，密被卵状披针形棕色鳞片。叶簇生，叶柄长 8—10 厘米，基部直径约 2 毫米，禾秆色，腹面有浅纵沟，下部密生卵形及披针形棕色鳞片，鳞片边缘流苏状，向上秃净；叶片矩圆披针形，长 18—30 厘米，宽 6—8 厘米，先端渐狭，基部略宽狭，奇数一回羽状；侧生羽片 8—15 对，互生，略斜向上，柄极短，镰状披针形，中部的长 3—4 厘米，宽 1—1.5 厘米，先端渐尖，基部偏斜、上侧近截形、下侧楔形、边缘有前倾的小齿；具羽状脉，小脉联结成 2 行网眼，两面不明显；顶生羽片狭卵形，下部有 1 或 2 个浅裂片，长 3—5 厘米，宽 2—3 厘米；叶为纸质，两面光滑；叶轴腹面有浅纵沟，疏生披针形及线形棕色鳞片。孢子囊群靠近叶边，两侧各有 1—2 行；囊群盖圆形，盾状，边缘流苏状或有小齿。

产山东南部 (塔山)。生林下岩石缝，海拔 500 米。

28. 阔羽贯众 (植物分类学报) 同羽贯众 (植物分类学报)，狭顶贯众 (植物分类学报) 图版 60: 3—5

*Cyrtomium yamamotoi* Tagawa in Acta Phytotax. Geobot 7: 187. 1938; Shing in Acta Phytotax. Sinica Addit. I: 28. 1965; Fl. Tsinling 2: 150; 1974; 蒋木青, 安徽