

面；囊群盖圆形，盾状，全缘。

产台湾、云南、西藏（聂拉木）。生常绿阔叶林中，海拔 2600 米。模式标本采自云南金平。

37. 等基贯众（植物分类学报） 学煜贯众（植物分类学报），楔基贯众（植物分类学报） 图版 62: 1

Cyrtomium aequibasis (C. Chr.) Ching in Bull. Chin. Bot. Soc. **2** (2): 99. 1936; Shing in Acta Phytotax. Sinica Addit. **I**: 44. 1965. — *C. caryotideum* Presl var. *aequibasis* C. Chr. in Amer. Fern Journ. **20** (2): 51. 1930; Tard.-Blot et C. Chr. in Fl. Indochine **7** (2): 378. 1941. — *C. houi* Ching ex Shing l. c. 44. 1965. — *C. cuneatum* Ching ex Shing l. c. 44. 1965.

植株高 30—50 厘米。根茎直立，密生披针形黑棕色鳞片。叶簇生，叶柄长 22—36 厘米，基部直径 2—3 厘米，禾秆色，腹面有浅纵沟，下部密生卵形及披针形黑棕色鳞片，鳞片有睫毛状齿，常扭曲，向上部渐秃净。叶片矩圆形或矩圆披针形，长 30—40 厘米，宽 12—20 厘米，先端钝，基部不变狭，奇数一回羽状；侧生羽片 4—6 对，互生，略斜向上，柄极短，披针形，中部的长 10—16 厘米，宽 2.2—3.5 厘米，先端渐尖或成尾状，基部楔形，边缘有开张的小尖齿；具羽状脉，小脉联结成 3—5 行网眼，两面微凸起；顶生羽片卵形或菱状卵形，2 叉或 3 叉状，长 11—13 厘米，宽 5—8 厘米。叶为纸质或坚纸质，两面光滑；叶轴腹面有纵沟，疏生线形卷曲的棕色鳞片或秃净。孢子囊群遍布羽片背面；囊群盖圆形，盾状，边缘有齿。

产四川（无详细地点）、贵州（都匀）、云南（蒙自、龙陵、马关）。生常绿阔叶林下，石灰岩上，海拔 600—2000 米。模式标本采自云南蒙自。

38. 云南贯众（植物分类学报） 硕美贯众（植物分类学报） 图版 62: 4

Cyrtomium yunnanense Ching et Shing in Acta Phytotax. Sinica Addit. **I**: 45. 1965. — *C. spectabile* Ching ex Shing l. c. 45. 1965. — *C. aequibasis* Ching in Bull. Chin Bot. Soc. **2** (2): 99. 1936 p. p. quoad Henry 9123B.

植株高可达 1 米。根茎未见。叶柄长 40—55 厘米，基部直径 3—5 毫米，禾秆色，腹面有浅纵沟，基部密生卵形及披针形棕色鳞片，鳞片边缘有齿，向上部秃净。叶片矩圆形或矩圆披针形，长 25—50 厘米，宽 15—25 厘米，先端钝，基部略变狭，奇数一回羽状；侧生羽片 4—6 对，互生，略斜向上，有短柄，披针形，略向上弯成镰状，中部的长 10—18 厘米，宽 2.5—4 厘米，先端渐尖，基部圆楔形或宽楔形、上侧多少下延于羽柄，边缘有开张的小尖齿；具羽状脉，小脉联结成 5—6 行网眼，两面不明显；顶生羽片卵形，2 叉状，长 8—11 厘米，宽 3—6 厘米。叶为坚纸质，两面光滑；叶轴腹面有浅纵沟，秃净。孢子囊群遍布羽片背面；囊群盖圆形，盾状，全缘。

产云南（中部及南部）。模式标本采自云南景东。



图版 62 1. 等基贯众 *Cyrtomium aequibasis* (C. Chr.) Ching: 叶。2. 显脉贯众 *Cyrtomium nervosum* Ching et Shing: 羽片。3. 尖齿贯众 *Cyrtomium serratum* Ching et Shing: 羽片。4. 云南贯众 *Cyrtomium yunnanense* Ching: 羽片。(陈笈绘)