

本九州。

模式种; *Cyrtomidictyum lepidocaulon* (Hook.) Ching

分种检索表

1. 可育叶线形, 宽 2—3.5 厘米, 全缘或下部羽裂; 不育叶一回羽状或下部羽裂。
 2. 不育叶一回羽状, 羽片基部下侧有耳状凸起, 叶轴伸长呈匍伏的鞭状, 先端有 1 芽孢, 着地生成新株 1. 卵状鞭叶蕨 *C. conjunctum* Ching
 2. 单叶, 下部羽裂, 裂片基部无耳状凸起 2. 单叶鞭叶蕨 *C. basipinnatum* (Bak.) Ching
1. 可育叶卵状披针形或阔披针形, 宽 5.5 厘米以上, 一回羽状, 羽片镰刀状。
 3. 羽片近全缘, 基部下侧耳片短尖; 每组叶脉的基部上方 1 脉向外伸达半途而止; 主脉两侧各有 2 行孢子囊群 3. 鞭叶蕨 *C. lepidocaulon* (Hook.) Ching
 3. 羽片边缘有尖锯齿, 基部下侧耳片长尖; 每组叶脉都伸达叶边, 主脉两侧各有 1 行孢子囊群 4. 阔镰鞭叶蕨 *C. faberi* (Bak.) Ching

1. 卵状鞭叶蕨 (中国蕨类植物图谱)

Cyrtomidictyum conjunctum Ching in Acta Phytotax. Sin. 6 : 263. 52. 1957 et Ic. Fil. Sin. 5 : pl. 248. 1958.

植株高 20—38 厘米。根状茎短, 直立, 连同叶柄密被鳞片, 鳞片棕色、卵状或披针形, 边缘有睫毛。叶簇生, 柄长 10—20 厘米, 径 1.5—2 毫米, 棕禾秆色; 叶片披针形, 长 10—20 厘米, 宽 2.2—5 厘米, 先端渐尖, 基部圆楔形, 下部一回羽状; 羽片 5—7 对, 互生, 近平展, 卵状三角形, 长 1.5—2.5 厘米, 宽 1—1.2 厘米, 急尖头, 基部不对称, 上侧截形并略呈耳状凸起, 下侧近圆形, 全缘或上侧浅裂, 裂片 4—5 个, 全缘; 中部深裂至全裂, 上部浅裂; 裂片边缘有粗锯齿。叶脉分离, 侧脉分叉, 每组 3—4 个, 小脉伸达叶边, 下面可见。叶亚革质, 干后棕色, 上面光滑; 叶轴和羽轴下面密被棕色、卵形或披针形鳞片。孢子囊群小, 圆形, 生小脉顶部, 在主脉两侧各排成 2 行, 外行稀疏; 无囊群盖。

产江西。生山脚石缝或常绿阔叶林旁溪边, 海拔 300 米。模式标本采自江西宜丰。

2. 单叶鞭叶蕨 (中国主要植物图说)

Cyrtomidictyum basipinnatum (Bak.) Ching in Acta Phytotax. Sinica. 6 : 262. pl. 51. 1957; 傅书遐, 中国主要植物图说·蕨类植物门 191. 1957; Ching, Ic. Fil. Sin. 5 : pl. 247. 1958. — *Aspidium basipinnatum* Bak. in Journ. Bot. 176. 1889; Christ in Warb. Monsunia 1: 77. 1900. — *Polystichum basipinnatum* Diels in Engl. u Prantl, Nat. Pflanzenfam. 1 (4): 189. 1899; C. Chr. Ind. Fil. 579. 1905.

植株高 30—40 厘米。根状茎直立, 连同叶柄密被棕色、卵形, 先端纤维状, 边缘有睫毛的鳞片。叶簇生, 二型, 柄长 6—16 厘米, 径 1.5—2 毫米, 棕禾秆色; 可育叶叶片线状披针形, 长 15—20 厘米, 中部宽 2.2—3.5 厘米, 渐尖头, 基部近截形, 羽状浅裂至全裂; 基部一对长圆形, 长 1.3—1.8 厘米, 宽约 1 厘米, 钝尖头, 基部近圆形, 全缘或有不明显的波状齿; 向上的羽片基部或多或少与叶轴合生, 中部以上为浅裂至深裂, 裂片先端全缘。不育叶与可育叶同形, 通常羽裂较浅, 叶轴伸长呈鞭状匍伏茎, 顶