

组 2. 真铃组 Sect. *Eurya*

嫩枝圆柱形或具 2—4 棱；花药不具分格；子房无毛，胚珠每室通常 5—10 个，稀可在 10 个以上，花柱长 0.5—4 毫米。

组的模式：日本铃木 *E. japonica* Thunb.

中国有 53 种，12 变种，3 变型。

系 5. 长柱铃系 Ser. *Longistylae* Hu et L. K. Ling in Act. Phytotax. Sin. 11: 274, 1966.

嫩枝圆柱形；萼片卵形或近圆形，革质；雄蕊 10—20 枚，花药不具分格；子房无毛，花柱长 2—4 毫米。

系的模式：尾尖叶铃 *E. acuminata* DC.

中国有 12 种，3 变种。

29. 五柱铃

Eurya pentagyna H. T. Chang in Act. Phytotax. Sin. 3: 21, 1954; 海南植物志 1: 507, 1964; L. K. Ling in Act. Phytotax. Sin. 11: 304, 1966; 中国高等植物图鉴补编 2: 485, 1983; 广东植物志 2: 168, 1991.

灌木或小乔木，高 4—10 米；树皮灰褐色，稍平滑；嫩枝圆柱形，深褐色，密被黄褐色披散柔毛，小枝紫褐色或黑褐色，无毛或几无毛；顶芽锥形，密被黄褐色柔毛。叶薄革质，长圆形或长圆状倒披针形，长 5—9 厘米，宽 1.2—2 厘米，顶端窄缩呈长渐尖或尾状渐尖，基部阔楔形，边缘密生细锯齿，上面绿色，有光泽，无毛，下面黄绿色，疏被贴伏短柔毛，中脉上较密，中脉在上面凹下，下面凸起，侧脉 6—8 对，在上面不明显或隐约可见，在下面明显且隆起；叶柄长 3—4 毫米。花 1—2 朵生于叶腋，花梗长约 3 毫米，疏被短柔毛。雄花：小苞片 2，卵形，长约 1 毫米，顶端钝，外面密被短柔毛；萼片 5，质厚，近革质，干后褐色，卵形或长圆状卵形，长 2.5—3 毫米，顶端钝或几圆形，有尖头，被短柔毛；花瓣 5，白色，长圆形，长约 4 毫米；雄蕊约 14 枚，花药不具分格，退化子房无毛。雌花的小苞片和萼片与雄花同；花瓣 5，卵状披针形，长约 3.5 毫米；子房卵圆形，无毛，5 室，花柱 5，离生，长约 3 毫米。果实圆球形，未熟。花期 10—11 月。

产于海南省保亭、白沙等地；多生于山地或山谷密林中及林缘。模式标本采自海南保亭。

30. 岗铃 图版 31: 5—7

Eurya groffii Merr. in Philip. Journ. Sci. Bot. 25: 247, 1919; 钟心煊，中国木本植物目录 173, 1924; Melchior in Engler, Nat. Pflanzenfam. 2 Aufl. 21: 148, 1925; Kobuski in Journ. Arn. Arb. 21: 155, 1940; H. T. Chang in Act. Phytotax. Sin. 3: 28, 1954; Hsu in Act. Phytotax. Sin. 9: 90, 1964; 海南植物志 1: 507, 1964; L.