

长4—5毫米；雄蕊17—18枚，花丝分离，花药不具分格，退化子房无毛。雌花的小苞片和萼片与雄花同，但较小；花瓣5，长圆形，长约3毫米；子房圆球形，5室，稀4室，无毛，花柱顶端5裂，稀4裂。果圆球形，直径5—6毫米，成熟时黑色。花期11—12月，果期次年6—7月。

产于广西中部以南（大瑶山、罗城、上思、那坡、平南、大苗山、大明山、十万大山、靖西、上林、防城）、贵州北部（习水、赤水）、云南东南部（屏边、西畴、麻栗坡、金平）等地；多生于海拔800—1500米的山地林下、沟谷溪边及林间空旷地。越南中部（安南）也有。模式标本采自广西罗城。

本种叶薄纸质，长圆形或长圆状卵形，基部钝，侧脉在上面凹下以及子房5室，花柱顶端5裂，稀4裂等易于识别。

36. 偏心叶柃 异侧柃（云南）

Eurya inaequalis Hsu in Act. Phytotax. Sin. **9**: 87, 1964; L. K. Ling in Act. Phytotax. Sin. **11**: 311, 1966; 中国高等植物图鉴补编 **2**: 484, 1983; 云南种子植物名录, 上册 360, 1984.

灌木或小乔木，高2—5米；树皮灰褐色或黑褐色，平滑；嫩枝圆柱形，黄褐色，密被黄褐色披散柔毛，小枝红褐色或灰褐色，无毛或几无毛；顶芽锥形，密被黄褐色柔毛。叶革质或薄革质，长圆形或长圆状披针形，长5—10厘米，宽1.5—3厘米，顶端渐尖，基部为不等侧的圆形或近圆形，下侧较大，几圆形，边缘密生细锯齿，上面绿色，稍有光泽，无毛，下面干后棕黄色，被柔毛，中脉上更密，中脉在上面凹下，下面凸起，侧脉10—14对，在上面明显凹下，下面凸起；叶柄极短，长不过1毫米，被柔毛。花1—4朵簇生于叶腋，花梗长1.5—3毫米，被柔毛。雄花：小苞片2，卵形，长约1毫米，顶端钝；萼片5，质厚，卵形或卵圆形，长约2毫米，顶端钝或近圆形，外面被短柔毛；花瓣5，白色，长圆形，长约4毫米；雄蕊12—15枚，花药不具分格，退化子房无毛。雌花的小苞片和萼片与雄花同；花瓣5，长圆状倒卵形，长约4毫米；子房卵形，无毛，花柱长约2毫米，顶端3—4裂。果实未见。花期11—12月。

产于云南东南部的屏边一带；生于海拔1250—1600米的山地疏林中湿润地或山坡灌丛中。模式标本采自云南屏边。

本种在外形上和岗柃 *E. groffii* Merr. 很相似，但本种的叶片基部为不等侧的圆形或近圆形，雄蕊12—15枚以及花柱3—4裂等易于区别。

37. 斜基叶柃 斜叶柃（中国高等植物图鉴补编） 图版33: 1—3

Eurya obliquifolia Hemsl. in Hook. , Icon. Pl. **28**: t. 2761, 1903; 钟心煊, 中国木本植物目录 **173**, 1924; Melchior in Engler, Nat. Pflanzenfam. **2**: Aufl. **21**: 148, 1925; Kobuski in Ann. Miss. Bot. Gard. **25**: 315, 1937; H. T. Chang in Act. Phytotax. Sin. **3**: 26, 1954, quoad spec. 蔡希陶 51379; 陈嵘, 中国树木分类学（第二版）829,