

L. K. Ling in Act. Phytotax. Sin. **11**: 318, 1966; 中国高等植物图鉴补编 **2**: 488, 1983; 广东植物志 **2**: 174, 1991; 广西植物志 **1**: 844, 1991.

本变型的主要特征是顶芽和嫩枝都有短柔毛,叶柄及萼片也偶有短柔毛等易于识别。

产于广东(惠阳)和广西(南宁、上思、邕宁、靖西、龙胜);生于山地溪沟灌丛中。模式标本采自广东惠阳。

49. 丛化桫

Eurya metcalfiana Kobuski in Journ. Arn. Arb. **20**: 368, 1939; H. T. Chang in Act. Phytotax. Sin. **3**: 48, 1954; L. K. Ling in Act. Phytotax. Sin. **11**: 319, 1966; 福建植物志 **3**: 505, 1987; 广东植物志 **2**: 176, 1991; 浙江植物志 **4**: 26, 图 4—267, 1993.

灌木,高 1—2 米;嫩枝黄褐色,具明显 2 棱,无毛,小枝灰褐色,也有 2 棱;顶芽披针形,无毛。叶革质,倒卵状窄椭圆形或倒卵状披针形至倒卵形,长 2—3.5 厘米,宽 1—1.5 厘米,顶端短钝,并有微凹,有时近圆形;基部楔形,边缘具细锯齿,上面深绿色,有光泽,下面淡黄绿色,两面无毛,中脉在上面凹下,下面凸起,侧脉 7—10 对,连同网脉在上面明显凹下,下面稍凸起;叶柄长 1—2 毫米。花 1—2 朵腋生,花梗长 2—3 毫米,无毛。雄花:小苞片 2,近圆形;萼片 5,卵形或圆形,长约 3 毫米,无毛;花瓣 5,白色,倒卵形,长约 5 毫米,基部稍合生;雄蕊约 15 枚,花药不具分格,退化子房无毛。雌花的小苞片与雄花同;萼片 5,近圆形,长 1.5—2 毫米,无毛;花瓣 5,长卵形,长约 3 毫米;子房长卵形,无毛,花柱长 2—3 毫米,顶端 3 裂。果实长卵形,长 4—5 毫米,直径 2—3 毫米,成熟时紫黑色,无毛。花期 11—12 月,果期次年 7—9 月。

产于江苏南部溧阳、安徽南部休宁、浙江南部(龙泉、遂昌、开化、寿江、新江)、福建(崇安、泰宁、建阳、古田、福清、永安、德化、连城)、湖南南部莽山、广东(乳源、增城、阳山、龙门、从化)、贵州东南部雷山等地;多生于海拔 180—1600 米的山地林中、林缘及沟谷溪边灌丛中。模式标本采自广东从化三角山。

本种和窄叶桫 *E. stenophylla* Merr. 甚为近似,区别仅在于叶革质,较小且稍薄,倒卵状披针形或倒卵状窄椭圆形,顶端钝而有微凹,侧脉和网脉在上面凹下以及雄蕊约 15 枚等。

50. 多脉桫 图版 35: 1—5

Eurya polyneura Chun in Sunyatsenia **2**: 55, pl. 16, 1934; et in Hu et Chun, Icon. Pl. Sin. **5**: 7, pl. 207, 1937; Kobuski in Ann. Miss. Bot. Gard. **25**: 307, 1937; H. T. Chang in Act. Phytotax. Sin. **3**: 42, 1954; L. K. Ling in Act. Phytotax. Sin. **11**: 319, 1966; 中国高等植物图鉴补编 **2**: 489, 1983; 广东植物志 **2**: 173, 1991; 广西植物志 **1**: 846, 1991.

灌木,高约 4 米,全株无毛;树皮灰褐色,稍平滑;嫩枝绿色,粗壮,具显著 2 棱,