

绿色，绝不为红褐色，花药具分格以及花柱 3 浅裂至 3 深裂等有明显的不同。

本种在湖南、江西、广东等省有部分标本的嫩枝被稀疏微毛，萼片边缘有纤毛，但其他特征则完全一致，仍应归本种。

53. 矩圆叶柃 图版 36: 1—3

Eurya oblonga Yang in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China **12**: 133, 1941; Hsu in Act. Phytotax. Sin. **9**: 95, 1964; L. K. Ling in Act. Phytotax. Sin. **11**: 321, 1966; 中国高等植物图鉴补编 **2**: 491, 1983; 贵州植物志 **5**: 87, 1988; 四川植物志 **8**: 223, 图 80, 1989. — *Eurya szechuanensis* H. T. Chang in Act. Phytotax. Sin. **3**: 43, 1954.

53a. var. *oblonga*

灌木或小乔木，高 2—8 米，全株无毛；嫩枝淡褐色，具 2 棱，小枝略呈圆柱形，淡黄灰色或灰褐色；顶芽披针形，渐尖，无毛。叶革质或薄革质，长圆形，有时为长圆状披针形或长圆状椭圆形，长 6—13.5 厘米，宽 2.5—4 厘米，顶端渐尖至尾状渐尖，尖顶常有微凹，尾长约 1 厘米，基部楔形或近圆形，边缘密生细锯齿，上面深绿色，有光泽，偶有金黄色腺点，下面淡绿色或干后变为红褐色，有光泽，中脉在上面凹下，下面凸起，侧脉 8—14 对，在上面稍凹下，下面明显凸起；叶柄长 5—10 毫米。花 1—3 朵腋生，花梗长 1—1.5 毫米，无毛。雄花：小苞片 2，圆形，较细小，长约 1 毫米；萼片 5，近革质，圆形，长 2.5—3 毫米，顶端圆而有微凹，无毛；花瓣 5，白色，长圆状倒卵形，长 4—5 毫米；雄蕊 13—15 枚，花药不具分格，退化子房无毛。雌花的小苞片和萼片与雄花同，但较小；花瓣 5，长圆形或倒卵形，长约 3.5 毫米；子房圆球形，3 室，无毛，花柱长约 1 毫米，3 深裂几达基部，稀为 4 深裂。果实圆球形，有时稍扁，直径 5—6 毫米，成熟时黑色。花期 11—12 月，果期次年 6—8 月。

产于广西（田林）、四川中部（洪雅、古蔺、筠连、蓬溪、峨眉、峨边、屏山、雷波、天全、汶川、汉阳、马边、雅安、洪化）、贵州北部（赤水、雷山）及云南东南部至东北部（金平、屏边、文山、马关、广南、绥江、盐津、大关）等地；多生于海拔 1100—2500 米的山坡、山顶林中或林缘阴湿地。模式标本采自四川天全。

本种和黑柃 *E. macartneyi* Champ. 很近似，但嫩枝有 2 棱，叶革质，较薄，侧脉在上面凹下，雄蕊约 15 枚以及花柱长仅 1 毫米等易于识别。

53b. 合柱矩圆叶柃（变种）

var. *stylosa* Yang in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China **12**: 133, 1941; L. K. Ling in Act. Phytotax. Sin. **11**: 321, 1966; 中国高等植物图鉴补编 **2**: 491, 1983

本变种和原变种的区别仅在于花柱在中部以下结合。

产于四川洪雅一带；生境和原变种一样。模式标本采自四川洪雅。

54. 卵叶柃

Eurya ovatifolia H. T. Chang in Act. Phytotax. Sin. **3**: 40, 1954; 海南植物志 **1**:

509, 1964; L. K. Ling in Act. Phytotax. Sin. 11: 321, 1966; 中国高等植物图鉴补编 2: 488, 1983; 广东植物志 2: 173, 1991.

灌木或小乔木，高约 4 米，全株无毛；嫩枝和小枝均为灰褐色，圆柱形；顶芽披针形，长 1—1.3 厘米。叶革质，卵形，长 4—7 厘米，宽 2—4 厘米，顶端急窄缩呈短尖，尖头长 4—6 毫米，基部圆形，边缘密生细锯齿，干后上面暗绿色，下面红褐色，两面无毛，中脉在上面凹下，下面凸起，侧脉 8—10 对，在上面稍明显，下面凸起；叶柄长 2—2.5 毫米。雄花：1—3 朵簇生于叶腋，花梗长 1—1.5 毫米，无毛；小苞片 2，卵圆形，微小；萼片 5，近圆形，长 1.5—2 毫米，顶端圆，有微凹；花瓣 5，倒卵形，长约 4 毫米，基部合生；雄蕊 11—12 枚，花药不具分格，退化子房无毛。雌花未见。果实卵形，有时近卵圆形，长约 4.5 毫米，直径约 3.5 毫米，3 室，无毛，宿存花柱长约 1 毫米，顶端 3 浅裂；宿存萼片近圆形，长约 2 毫米，无毛；果梗长约 2 毫米。花期 11—12 月，果期次年 6—7 月。

产于海南省陵水、白沙及定安一带；生于中海拔至高海拔的近山顶林中。模式标本采自海南定安五指山。

本种和黑柃 *E. macartneyi* Champ. 很近似，但本种叶卵形，基部圆形，边缘密生细锯齿，雄蕊约 10 枚以及宿存花柱长约 1 毫米，顶端 3 浅裂等易于分开。

55. 红柃 图版 37: 1—4

Eurya rubiginosa H. T. Chang in Act. Phytotax. Sin. 3: 45, 1954; L. K. Ling in Act. Phytotax. Sin. 11: 321, 1966; 中国高等植物图鉴补编 2: 491, 1983; 广东植物志 2: 174, 1991.

55a. var. *rubiginosa*

灌木，高 2.5—3.5 米，全株除萼片外均无毛；嫩枝黄绿色，具明显 2 棱，小枝灰褐色，也具 2 棱，老枝灰白色；顶芽长锥形。叶革质，卵状披针形，有时为长圆状披针形，长 8—12 厘米，宽 2.5—4 厘米，顶端尖、短尖或短渐尖，尖顶尖或钝，基部圆形，或偶有近心形，边缘密生细锯齿，干后稍反卷，干后上面暗绿色，下面红褐色，两面无毛，中脉在上面稍凹下，下面凸起，侧脉 13—15 条，两面均甚明显，且稍凸起；叶柄极短。花 1—3 朵簇生于叶腋，花梗长 1—1.5 毫米，无毛。雄花：小苞片 2，卵形或卵圆形，细小，长约 0.5 毫米，顶端尖或近圆形，并有小突尖；萼片 5，近圆形，质厚，近革质，长约 2 毫米，顶端圆，且有微凹，外面被短柔毛；花瓣 5，倒卵形，长 3—4 毫米；雄蕊约 15 枚，花药不具分格，退化子房无毛。雌花的小苞片和萼片与雄花同，但稍小；花瓣 5，长圆状披针形，长约 3 毫米；子房卵圆形，3 室，无毛，花柱长 1—1.5 毫米，顶端 3 裂。果实圆球形或近卵圆形，长约 4 毫米，成熟时紫黑色。花期 10—11 月，果期次年 4—5 月。

产于广东增城、新丰、从化、龙门、连山等地；多生于海拔 600—800 米的山坡疏林中或林缘沟谷路旁。模式标本采自广东从化。