

地及林缘灌丛密阴处。模式标本采自广西象州县。

本种和川柃 *E. fangii* Rehd. 很近似, 但嫩枝具 2 棱, 全株无毛, 叶厚革质, 倒卵形, 侧脉和网脉在上面明显凹下, 萼片边缘无纤毛以及雄蕊 5—6 枚, 花柱顶端 3 裂等易于区别。

77b. 毛岩柃 (变型)

f. puberula H. T. Chang in Act. Phytotax. Sin. 3: 27, 1954; Hsu in Act. Phytotax. Sin. 9: 88, 1964; L. K. Ling in Act. Phytotax. Sin. 11: 338, 1966; 中国高等植物图鉴补编 2: 487, 1983; 福建植物志 3: 501, 1987; 广东植物志 2: 170, 1991.

本变型和原变型的区别仅在于嫩枝近圆柱形, 有时具浅 2 棱, 均密被微毛。花果期同原种。

产于江西武夷山、福建 (崇安黄冈山和德化戴云山)、湖南 (莽山)、广东北部 (乳源) 及广西 (临桂、大苗山、灌阳、灵川) 等地; 生境和原种相同。模式标本采自湖南宜章莽山。

78. 麻栗坡柃 图版 44: 7—10

Eurya marlipoensis Hu in Act. Phytotax. Sin. 11: 338, 1966; 中国高等植物图鉴补编 2: 490, 1983; 云南种子植物名录, 上册 361, 1984.


灌木, 高 1.5—2 米, 全株无毛; 嫩枝有 2 棱, 淡褐色, 小枝灰褐色, 略具 2 棱; 顶芽披针形或卵状披针形, 渐尖, 长 3—5 毫米, 无毛。叶薄革质, 倒卵形或倒卵状长圆形, 长 1.5—2.8 厘米, 宽 0.8—1.3 厘米, 顶端圆, 常有微凹, 基部楔形, 边缘有钝齿, 上面绿色, 有光泽, 下面淡绿色, 两面无毛, 中脉在上面凹下, 下面凸起, 侧脉 5—6 对, 在离叶缘处弧曲而连结, 在上面不明显, 有时稍凹下, 下面凸起, 网脉两面不明显; 叶柄长 1—1.5 毫米。雄花未见。雌花细小, 1—2 朵腋生, 花梗纤细, 长约 1 毫米, 稍弯曲; 小苞片 2, 微小, 卵形, 顶端尖; 萼片 5, 卵圆形或近圆形, 长 1—1.3 毫米, 顶端圆, 有腺状小突尖, 外面无毛, 边缘有纤毛; 花瓣 5, 白色, 长圆形或倒卵状椭圆形, 长 2—2.3 毫米, 基部稍合生; 子房卵形, 无毛, 长约 1.2 毫米, 2 室, 偶有 3 室, 胚珠每室 2 个, 花柱长约 1 毫米, 顶端 2 裂, 偶有 3 裂。果实卵状圆球形, 绿色, 未熟, 直径约 3.5 毫米, 果梗纤细, 长约 3 毫米, 宿存花柱长约 1 毫米。花期 11 月。

产于云南东南部麻栗坡一带; 生于海拔 1400—1800 米的山地林下阴湿处。模式标本采自云南麻栗坡。

本种和岩柃 *E. saxicola* H. T. Chang 很相似, 但那个种的嫩枝粗壮, 明显具 2 钝棱, 叶厚革质, 边缘反卷, 侧脉和网脉在上面明显凹下, 萼片边缘无纤毛以及花柱 3 裂等易于区别。

79. 厚叶柃

Eurya crassilimba H. T. Chang, Fl. Xizangic. 3: 267, 图 110: 2—5, 1986.



图版 44 1—3. 云南凹脉柃 *Eurya cavinervis* Vesque; 1. 果枝; 2. 雄花; 3. 果实。4—6. 大果柃 *Eurya chukiangensis* Hu; 4. 果枝; 5. 雌花; 6. 雌蕊。7—10. 麻栗坡柃 *Eurya martipoensis* Hu; 7. 雌花枝; 8. 雌花; 9—10. 雌蕊。(蔡淑琴绘)