

1985.

灌木,植株无毛,各部无黑腺体;花瓣及雄蕊花后脱落;花柱5(4),分离或部分合生;雄蕊5(4)束,花药明显背着。

约40余种,分布于土耳其、保加利亚南部、巴基斯坦、印度、斯里兰卡、尼泊尔、锡金、不丹、缅甸、印度尼西亚西部、泰国、越南至中国。我国有26种,除东北及新疆外几遍布全国,但以西南最多。

1. 椭圆叶金丝桃(中国高等植物图鉴补编第二册) 图版1: 5—6

Hypericum elliptifolium Li in Journ. Arn. Arb. **25**: 307. 1944.

灌木,高0.3—0.6米,直立。根茎水平伸展。茎少数,圆柱形,纤细,红褐色,不分枝或上部分枝,分枝短小,长达15厘米。叶对生,无柄,椭圆形,长3—5厘米,宽1.5—3厘米,先端圆形、微凹或具小尖突,基部圆形,边缘全缘而内卷,坚纸质,上面榄绿色,下面淡绿色,侧脉每侧2—3条,与中脉在上面近明显,下面明显,纤细,弧曲上升,向顶端弯曲,小脉纤细,多数,多少与叶缘平行。花序顶生,具5—6花,为近伞状聚伞花序;总梗长约8毫米;小苞片细小,长不及1毫米。花小,直径约1.5厘米,平展;花梗长约8毫米。萼片长圆状卵形,先端长渐尖,长约7毫米,宽2毫米。花瓣白色,倒卵形,长1—1.2厘米,先端近锐尖。雄蕊多数,花丝长达6毫米。子房卵珠形,长约5毫米,花柱3,分离,长约2毫米。蒴果卵珠形,长7毫米,宽4毫米,有宿存的花萼和花柱。种子梭形,长约0.6毫米,黑褐色,两端渐尖,两侧有龙骨状突起,表面有细蜂窝纹。花期8—9月,果期9—10月。


产云南西北部。生于山坡草丛中,海拔1800—2200米。模式标本采自云南贡山。

本种花白色而小,花序为近伞状聚伞花序极为特异,据 N. Robson 意见(私人通信)认为它很可能是黄牛木族 Trib. *Cratoxyleae* Engl. 的一个新属,其位置介于三腺金丝桃属 *Triadenum* 和产自墨西哥的 *Thornea* 属之间。今暂志于此。

2. 无柄金丝桃(新拟) 图版6: 1—5

Hypericum augustinii N. Robson in Journ. Roy. Hort. Soc. **95**: 495. 1970, in Journ. Jap. Bot. **52**: 278, f. 2. 1977 et in Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. Bot. **12**(4): 219, f. 14. 1985.

灌木,高约1米。茎无或有少数侧枝,幼时具4纵线棱及两侧压扁,不久无纵线棱,最后呈圆柱形;皮层红褐色。叶对生,全部无柄或下部(偶有除最上部叶外全部叶)具长达1.5毫米的扁平叶柄;叶片长圆状披针叶或长圆状卵形至宽卵形,长(3)3.7—7.5厘米,宽(1—)1.5—4.4厘米,先端锐尖至圆形而具小尖突,基部圆形至近心形,上部叶者则抱茎,边缘扁平,不或几不增厚,革质,上面绿色,下面淡绿且多少呈苍白色。主侧脉3对,中脉在上方分枝,无可见的第三级脉网,腹腺体密集,而叶片腺体长线状及点状。花序具(1—)3—13花,自1—2节生出,近伞房状,顶端第1节短或很短,下方无分枝;花梗长6—12毫米;主茎上的苞片宽卵形,通常形成一假轮状,其余苞片退化,宽卵形至披针形,脱



1—4 美丽金丝桃(原亚种) *Hypericum bellum* Li subsp. *bellum*: 1.花枝, 2.花, 3.果, 4.雄蕊。5—6.椭圆叶金丝桃 *H. elliptifolium* Li: 5.果枝, 6.果。(肖溶绘)