

产河北、陕西、山东、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川及贵州等省区。生于山坡、路旁或灌丛中，沿海地区海拔0—150米，但在山地上升至1500米。日本也有引种。模式是 Miller, Figures plants: 101, t. 151, f. 2. 1760。

花美丽，供观赏；果实及根供药用，果作连翘代用品，根能祛风湿、止咳、下乳、调经补血、并可治跌打损伤。

本种变异幅度很大，可根据叶形、花序以及萼片大小上的变异至少可划分为四个类型，即1) 柳叶型：叶椭圆形至倒披针形，先端锐尖，基部楔形；花序很稀疏；萼片狭卵形而先端锐尖，分布自华中至沿海地区；2) 钝叶型：叶较短，长圆形，先端钝形或圆形，基部圆形；花序稍稀疏；萼片狭长圆形而先端钝；分布自湖北东部及江西，南达广东沿海地区；3) 宽萼型：叶和萼片较宽，前者自宽椭圆形（基部锐尖及楔形）至宽长圆形（基部圆形及心形），后者有时叶状，花序也是疏松；分布区同第一类型；4) 卵叶型：叶短，椭圆形至卵形或三角状卵形，先端钝形至圆形，基部宽楔形至圆形，但萼片长而狭，该类型见于四川南部。上述四个类型由于在形态特征和地理分布上均显示出连续性质，因此似无必要作种下分类。

6. **大叶金丝桃**（中国高等植物图鉴补编第二册） 瘦黄狗、三黄筋（四川屏山） 图版4: 5—7

Hypericum prattii Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **29**: 303. 1892; Diels in Engl. Bot. Jahrb. **29**: 475. 1900; Lév. in Bull. Soc. Bot. France **54**: 590. 1907; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. **2**: 404. 1915, pro parte excl. Wilson 1640, 2420; N. Robson in Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. Bot. **12**(4): 235. 1985.

灌木，高0.75—1米，有开张的枝条。茎红色，幼时具4纵线棱及两侧压扁，很快呈圆柱形；节间长1—5.5厘米，短于叶；皮层红褐色。叶对生，无柄；叶片宽卵形至椭圆状卵形，长4—11(14.5)厘米，宽2—5.1(—7)厘米，先端锐尖至短渐尖，基部心形而抱茎或最上部者为圆形，边缘平坦，坚纸质，上面绿色，下面淡绿但不呈苍白色，主侧脉4—5对，分枝，中脉羽状分枝，第三级脉网密集，下面尤为明显，无腹腺体，叶片腺体点状，很小。花序具3—10(—24)花，自茎顶第1节生出，疏松近伞房状；花梗长0.3—1(—2.5)厘米（结果时长达6厘米）；苞片小，线形，早落。花直径3.5—5.5厘米，星状；花蕾卵珠形，先端钝形至圆形。萼片离生，披针形至宽卵状心形（叶状），近等大至不等大，长0.9—1.7(—1.9)厘米，宽0.3—0.9(—1.1)厘米，先端圆形，全缘，中脉分明，小脉不显著，约有腺体9，基部的为线形，上方的为点状。花瓣金黄色，无红晕，开张，倒卵形至倒披针形，长2—2.6厘米，宽0.9—1.8厘米，边缘全缘，无腺体，有侧生小尖突，小尖突先端圆形或消失。雄蕊5束，每束有雄蕊30—40枚，最长者长1.8—2.4厘米，长几与花瓣相等；花药黄色。子房卵珠形，长4—6毫米，宽2.5—4.5毫米；花柱长1.1—1.9厘米，长约为子房3—3.5倍，合生几达顶端然后开张；柱头小。蒴果及种子未见。 花期6—7月。



1—4. 宽萼金丝桃 *Hypericum bellum* Li subsp. *latisepalum* N. Robson: 1. 花枝, 2. 叶, 下面观, 3. 果, 4. 雄蕊。 5—7. 大叶金丝桃 *H. prattii* Hemsl: 5. 花枝, 6. 叶, 下面观, 7. 幼果。(曾孝濂绘)

产四川、湖北。生于山坡上,海拔 800—1000 米。选模式标本采自四川康定。

本种极近于金丝桃 *H. monogynum* Linn., 但叶为卵形,先端常渐尖,基部常为心形且抱茎而不同。

7. 长柱金丝桃 (中国高等植物图鉴) 王不留行(四川青川),小连翘(湖北)

Hypericum longistylum Oliv. in Hook. Icon. Pl. 16: t. 1534. 1886; Diels in Engl. Bot. Jahrb. 29: 476. 1900; Lév. in Bull. Soc. Bot. France 54: 591. 1907; Pamp. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. n. ser. 17: 670, f. 15. 1910; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 2: 404. 1915; R. Keller in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, 21: 176. 1925; 中国高等植物图鉴 2: 878, f. 3486. 1972. — *H. longistylum* Oliv. var. *silvestri* Pamp. in l. c. 670, f. 15 b. 1910. — *Norysca longistyla* (Oliv.) Y. Kimura in Nakai & Honda, Nova Fl. Japon 10: 98. 1951.

7a. 长柱金丝桃 (原亚种) 图版 3: 1—6

subsp. ***longistylum***

灌木,高约 1 米,直立,有极叉开的长枝和羽状排列的短枝。茎红色,幼时有 2—4 纵线棱并且两侧压扁,最后呈圆柱形;节间长 1—3 厘米,短于至长于叶;皮层暗灰色。叶对生,近无柄或具短柄,柄长达 1 毫米;叶片狭长圆形至椭圆形或近圆形,长 1—3.1 厘米,宽 0.6—1.6 厘米,先端圆形至略具小尖突,基部楔形至短渐狭,边缘平坦,坚纸质,上面绿色,下面多少密生白霜,主侧脉纤弱,约 3 对,中脉的分枝不或几不可见,无或稀有很纤弱的第三级脉网,无腹腺体,叶片腺体小点状至很小点状。花序 1 花,在短侧枝上顶生;花梗长 8—12 毫米;苞片叶状,宿存。花直径 2.5—4.5(—5) 厘米,星状;花蕾狭卵珠形,先端锐尖。萼片离生或在基部合生,在花蕾及结果时开张或外弯,线形或稀为椭圆形,等大或近等大,长 0.3—0.6 厘米,边缘全缘,中脉多少明显,小脉不显著,腺体约 4,基部的线形,向顶端呈点状。花瓣金黄色至橙色,无红晕,开张,倒披针形,长 (1.1—)1.5—2.2(—2.4) 厘米,宽 0.4—0.8(—1) 厘米,长约为萼片 2.5—3.5 倍,边缘全缘,无腺体,无或几无小尖突。雄蕊 5 束,每束约有雄蕊 15—25 枚。子房卵珠形,长 3—4 毫米,宽 2—3 毫米,通常略具柄;花柱长 1—1.8 厘米,长约为子房 3.5—6 倍,合生几达顶端然后开张;柱头小。蒴果卵珠形,长 (0.4—)0.6—1.2 厘米,宽 0.4—0.5 厘米,通常略具柄。种子圆柱形,长约 1.3 毫米,淡棕褐色,有明显的龙骨状突起和细蜂窝纹。花期 5—7 月,果期 8—9 月。

产安徽、河南、湖北、湖南。生于山坡阳处或沟边潮湿处,海拔 200—1200 米。选模式标本采自湖北宜昌。

蒴果入药,清热解毒、散结消肿。

7b. 圆果金丝桃 (新拟)

subsp. ***giraldii*** (R. Keller) N. Robson in Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. Bot. 12(4): 239. 1985. — *H. giraldii* R. Keller in Engl., Bot. Jahrb. 33: 548. 1904;