

产四川、湖北。生于山坡上,海拔 800—1000 米。选模式标本采自四川康定。

本种极近于金丝桃 *H. monogynum* Linn., 但叶为卵形,先端常渐尖,基部常为心形且抱茎而不同。

7. 长柱金丝桃 (中国高等植物图鉴) 王不留行(四川青川),小连翘(湖北)

Hypericum longistylum Oliv. in Hook. Icon. Pl. **16**: t. 1534. 1886; Diels in Engl. Bot. Jahrb. **29**: 476. 1900; Lév. in Bull. Soc. Bot. France **54**: 591. 1907; Pamp. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. n. ser. **17**: 670, f. 15. 1910; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. **2**: 404. 1915; R. Keller in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, **21**: 176. 1925; 中国高等植物图鉴 **2**: 878, f. 3486. 1972. — *H. longistylum* Oliv. var. *silvestri* Pamp. in l. c. 670, f. 15 b. 1910. — *Norysca longistyla* (Oliv.) Y. Kimura in Nakai & Honda, Nova Fl. Japon **10**: 98. 1951.

7a. 长柱金丝桃 (原亚种) 图版 3: 1—6

subsp. ***longistylum***

灌木,高约 1 米,直立,有极叉开的长枝和羽状排列的短枝。茎红色,幼时有 2—4 纵线棱并且两侧压扁,最后呈圆柱形;节间长 1—3 厘米,短于至长于叶;皮层暗灰色。叶对生,近无柄或具短柄,柄长达 1 毫米;叶片狭长圆形至椭圆形或近圆形,长 1—3.1 厘米,宽 0.6—1.6 厘米,先端圆形至略具小尖突,基部楔形至短渐狭,边缘平坦,坚纸质,上面绿色,下面多少密生白霜,主侧脉纤弱,约 3 对,中脉的分枝不或几不可见,无或稀有很纤弱的第三级脉网,无腹腺体,叶片腺体小点状至很小点状。花序 1 花,在短侧枝上顶生;花梗长 8—12 毫米;苞片叶状,宿存。花直径 2.5—4.5(—5) 厘米,星状;花蕾狭卵珠形,先端锐尖。萼片离生或在基部合生,在花蕾及结果时开张或外弯,线形或稀为椭圆形,等大或近等大,长 0.3—0.6 厘米,边缘全缘,中脉多少明显,小脉不显著,腺体约 4,基部的线形,向顶端呈点状。花瓣金黄色至橙色,无红晕,开张,倒披针形,长 (1.1—)1.5—2.2(—2.4) 厘米,宽 0.4—0.8(—1) 厘米,长约为萼片 2.5—3.5 倍,边缘全缘,无腺体,无或几无小尖突。雄蕊 5 束,每束约有雄蕊 15—25 枚。子房卵珠形,长 3—4 毫米,宽 2—3 毫米,通常略具柄;花柱长 1—1.8 厘米,长约为子房 3.5—6 倍,合生几达顶端然后开张;柱头小。蒴果卵珠形,长 (0.4—)0.6—1.2 厘米,宽 0.4—0.5 厘米,通常略具柄。种子圆柱形,长约 1.3 毫米,淡棕褐色,有明显的龙骨状突起和细蜂窝纹。花期 5—7 月,果期 8—9 月。

产安徽、河南、湖北、湖南。生于山坡阳处或沟边潮湿处,海拔 200—1200 米。选模式标本采自湖北宜昌。

蒴果入药,清热解毒、散结消肿。

7b. 圆果金丝桃 (新拟)

subsp. ***giraldii*** (R. Keller) N. Robson in Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. Bot. **12**(4): 239. 1985. — *H. giraldii* R. Keller in Engl., Bot. Jahrb. **33**: 548. 1904;