

Pavolini in Nuov. Giorn. Bot. Ital. n. ser. **15**: 406. 1908; Lév. in Bull. Soc. Bot. France **54**: 590. 1908. — *H. longistylum* Oliv. var. *giraldii* (R. Keller) Pamp. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. n. ser. **17**: 670, f. 15C. 1910.

与原亚种不同在于萼片长 5—7 毫米; 子房及蒴果圆球形而无柄。

产陕西、甘肃、湖北。生于山坡阳处, 海拔 1950—2090 米。模式标本采自陕西。

8. 近无柄金丝桃 (新拟)

Hypericum subsessile N. Robson in Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. Bot. **12**(4): 239. 1985.

灌木, 高约 1 米。茎红色, 幼时具 4 纵线棱及两侧压扁, 最后呈圆柱形; 节间长 1—3 厘米, 短于叶; 皮层灰褐色。叶对生, 近无柄或具极短的扁平叶柄; 叶片狭椭圆形, 长 3.5—6.5 厘米, 宽 0.7—2 厘米, 先端锐尖, 基部楔形, 边缘平坦, 近革质, 上面绿色, 下面淡绿至苍白色, 主侧脉 3—4 对, 分枝, 中脉羽状分枝, 第三级脉网较稀疏, 不十分明显, 腹腺体稀疏至密集, 叶片腺体小点状及短腺条状。花序具 1—8 花, 自 1(—2) 节生出; 花梗长 0.8—2 厘米; 苞片小, 披针形至叶状, 凋落。花直径 3.5—4.5 厘米, 浅盂状; 花蕾卵珠形, 先端锐尖。萼片离生, 在花蕾时外弯, 结果时外折, 卵形至椭圆形, 不等大, 叶状, 长 1—1.8 厘米, 宽 0.4—1 厘米, 先端锐尖或渐尖, 边缘全缘, 中脉明显可见, 侧脉不明显, 约有腺体 8, 基部者线形, 向顶端者点状。花瓣亮黄色, 背面有红晕, 略内弯, 倒披针状倒卵形, 长 1.7—2 厘米, 宽 0.9—1.1 厘米, 长约为萼片 2 倍, 边缘全缘, 无腺体, 有近顶端的小尖突, 小尖突先端锐尖。雄蕊 5 束, 每束有雄蕊 40—60 枚, 最长者长 1.2—1.5 厘米, 长约为花瓣 7/10, 花药亮黄色。子房卵珠状圆锥形, 长 6—8 毫米, 宽 5—6 毫米; 花柱长 5—6 毫米, 长为子房 1/4—9/10, 离生, 近顶端外弯; 柱头狭头状。蒴果狭卵珠状圆锥形, 长 (1.6—) 1.8—2.1 厘米, 宽 (0.7—) 1—1.2 厘米。种子深红褐色, 圆柱形, 长 1.1—1.5 毫米, 顶端及一侧有翅, 有浅的线状蜂窝纹。花、果期 8—9 月。

产云南西部(大理)、四川西部(汉源)。生于山坡灌丛中, 海拔 2400—2550 米。模式标本采自云南大理苍山。

本种为一狭域分布的种, 只见于两地, 云南大理苍山者花序为单花, 而四川汉源者花序有 1—8 花; 它无疑与尖萼金丝桃 *H. acmosepalum* N. Robson 相近, 但不同在于叶近无柄, 有疏生脉网, 萼片较长且常为叶状, 花瓣较宽, 而雄蕊及花柱却较短。

9. 尖萼金丝桃 (新拟) 黄花香(云南屏边), 香针树(云南)

Hypericum acmosepalum N. Robson in Journ. Ray. Hort. Soc. **95**: 490. 1970 et in Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. Bot. **12**(4): 245. 1985.

灌木, 高 0.6—2 米, 有直立至上升的枝条。茎橙色, 当年生(或二年生)者具 4 纵线棱及两侧压扁, 其后呈圆柱形; 节间长 1—5 厘米, 短于至长于叶; 皮层灰褐色。叶有宽柄, 叶柄长 0.5—1(1.5) 毫米; 叶片长圆形或椭圆状长圆形至狭椭圆形, 有时向枝顶端者为披针