

Arn. var. *leschenaultii* sensu Dyer in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 254. 1874; Banerji in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 51: 774. 1953; non *H. leschenaultii* Choisy 1824. — *Norysca hookeriana* (Wight & Arn.) Wight var. *leschenaultii* sensu Y. Kimura in Hara, Fl. East. Himal.: 210. 1966, non *H. leschenaultii* Choisy 1824.

灌木,高 0.1—2 米,丛状,有直立至开张的枝条。茎红至橙色,幼时具 4 纵线棱及两侧压扁,最后呈圆柱形;节间长 1.5—5.5 厘米,通常短于叶;皮层灰褐色。叶具柄,叶柄长 2—4 毫米;叶片三角状披针形或稀为三角状卵形至卵形,长 2.5—8.8 厘米,宽 1—4.2 厘米,先端锐尖或渐尖至钝形或稀为圆形,基部宽楔形至圆形或近心形,边缘平坦,坚纸质,上面绿色,下面淡绿但不呈苍白色,主侧脉 3—5 对,分枝,下方者有时分离,中脉分枝凹陷,第三级脉网几不可见至明显而较密集,腹腺体无,叶片腺体呈条纹状和点状。花序具 1—7 花,自茎顶端的第 1 节生出,近伞房状;花梗长 3.5—11 毫米;苞片叶状至狭椭圆形,宿存。花直径 4—7 厘米,浅至深盂状;花蕾卵珠形,先端骤锐尖至钝形。萼片离生,在花蕾及结果时开张至下弯,狭至很宽的椭圆形,长 0.7—1.8 厘米(若明显叶状则更长),宽 0.2—1 厘米,先端锐尖至具小尖突或更稀为钝形,全缘,中脉明显可见,小脉不显著,腺体多数,线形,向顶端断线形。花瓣深金黄色,宽倒卵形至倒卵状圆形,长 1.6—3 厘米,宽 1.5—2.2 厘米,长约为萼片的 1.7—2.2 倍,边缘全缘,无腺体,有近顶生的小尖突,小尖突先端圆形。雄蕊 5 束,每束有雄蕊 60—80 枚,最长者长 6—10 毫米,长约为花瓣的 1/3—2/5,花药金黄色。子房多少呈宽卵珠形,长(5—)6—8(—9)毫米,宽 3.5—5.5 毫米;花柱长 3—5 毫米,长为子房的 1/3—7/10,近顶端外弯;柱头狭头状。蒴果卵珠状圆锥形至近圆球形,长(0.9—)1.4—1.9 厘米,宽 0.8—1.2 厘米。种子深褐色,圆柱形至圆柱状椭圆形,长 0.7—1 毫米,有龙骨状突起或有狭翅,表面有浅的线状网纹至线状蜂窝纹。花期 4—6 月,果期 9 月。

产云南(景东、贡山)、西藏南部(珠穆朗玛峰、亚东等地)。生于山坡或陡崖上、灌丛中或杜鹃林中,海拔 1600—4800 米。巴基斯坦、印度、尼泊尔、不丹、锡金、缅甸也有分布。模式标本采自印度。

本种与短柱金丝桃 *H. hookerianum* Wight & Arn. 十分相似,但后者的萼片直立,先端圆形且不呈叶状,雄蕊及花柱相对地较短,叶先端钝形且无网状脉序则可以区别。

19. 美丽金丝桃 (中国高等植物图鉴补编第二册)

Hypericum bellum Li in Journ. Arn. Arb. 25: 308. 1944; N. Robson in Journ. Roy. Hort. Soc. 95: 491, f. 239. 1970 et in Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. Bot. 12(4): 273. 1985.

19a. 美丽金丝桃(原亚种) 图版 1: 1—4

subsp. *bellum*

灌木,高 0.3—1.5 米,通常形成矮灌丛,有密集的直立或拱弯的枝条。茎红至橙色,初