

长圆形，长 2.5—3 毫米；子房长 4—4.3 毫米；花柱长 3.5—5 毫米，长为子房的 1—1.3 (—1.5) 倍；蒴果圆柱形至圆柱状椭圆形。

产我国台湾中部至北部(嘉义、南投、台中、宜兰、台北)。生于开旷的石砾山坡及路旁，海拔 1500—1800 米。模式标本采自台湾南投的能高山。

组 3. 黄海棠组——Sect. 3. *Roscyna* (Spach) R. Keller in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(6): 211. 1893; op. cit., ed. 2, 21:176. 1925; N. Robson in Bull. Brit. Mus. Nat. Hist. Bot. 5(6): 319. 1977.——*Roscyna* Spach, Hist. Nat. Vég., Phan. 5: 429. 1836, in Ann. Sci. Nat. Sér. 2, Bot. 5: 364. 1836; Y. Kimura in Nakai & Honda, Nova Fl. Japon. 10: 118. 1951.

多年生草本，植株无黑色腺体；花瓣及雄蕊宿存；花柱 5(4)，至少在基部多少合生；雄蕊 5(4) 束。

约 7 种，分布自中亚经我国及日本至美洲东北部。我国有 5 种(其中 2 种为存疑种)，几遍布全国各地。

31. 大萼金丝桃 (中国高等植物图鉴补编第二册)

Hypericum macrosepalum Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 3: 451. 1917.

多年生草本，无毛。茎具 4 纵线棱，紫红色，无毛。叶具短柄，叶柄长 2—3 毫米，叶片狭卵形至长圆形，长 5.5—7 厘米，宽 1.2—2.4 (—2.8) 厘米，先端钝，具长约 0.5 毫米的小尖突，基部宽楔形下延，上面绿色，下面淡绿色，全面散布透明腺点，中脉在上面凹陷，下面凸起，侧脉约 3 对，斜展，在上面平坦或凹陷，下面凸起，脉网稀疏。花序顶生，为 1—3 花聚伞状；苞片叶状。花直径约 4.5 厘米，平展；花梗纤细，长 2—2.5 厘米。萼片叶状，狭卵形至长圆形，长 (2—) 3.5—5.5 厘米，宽 1—1.5 厘米，先端锐尖。花瓣倒卵状长圆形，长约 2.2 厘米，宽 1—1.2 厘米，先端钝形，基部宽渐狭，两侧稍不对称，内边缘膜质，全缘。雄蕊 5 束，每束有雄蕊 20—25 枚，最长者达 1.4 厘米，花药黄色。子房卵珠形，长约 8 毫米，宽 5 毫米，花柱 5，长约 4 毫米，自基部离生，先端向外弯曲。成熟蒴果未见。花期 9 月。

产四川西部(康定、木里)。生于路旁旷地，海拔约 3300 米。模式标本采自康定东北方的打炮山。

32. 黄海棠 (中国经济植物志) 牛心菜、山辣椒(辽宁)，大叶金丝桃(甘肃)，救牛草(陕西)，八宝茶(山西)，水黄花(河北)，金丝蝴蝶(内蒙古、河北)，大金雀、大叶牛心菜(山东)，六安茶(江苏)，降龙草(安徽)，连翘(河北、贵州、台湾)，鸡蛋花(云南)，对月草、禁宫花(四川)，红旱莲(江西、宁夏)，湖南连翘(植物名实图考) 图版 8: 1—3

Hypericum ascyron Linn. Sp. Pl. 783. 1753; Choisy in DC. Prodr. 1: 545. 1824; Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 27: 430. 1882; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. 23:72. 1886; Franch. in Bull. Soc. Bot. France 33:436. 1886 et