

表面有细蜂窝纹。花期7—8月,果期9月。

产西藏(波密、米林、林芝、察隅、亚东)。生于山坡路旁、林缘、灌丛草地等处,海拔2000—3000米。巴基斯坦、不丹、尼泊尔、印度、锡金也有。模式标本采自尼泊尔。

42. 挺茎遍地金 (中国高等植物图鉴补编第二册) 图版 11:3—7

Hypericum elodeoides Choisy in DC. Prodr. 1:551. 1824; Franch. in Bull. Soc. Bot. France 33:438. 1886, Pl. Delav. 104. 1889; R. Keller in Engl. Bot. Jahrb. 33:553. 1904; Lév. in Bull. Soc. Bot. France 54: 594. 1908 “*helodeoides*”; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:403. 1931; N. Robson in Journ. Jap. Bot. 52(9):285. 1977. — *H. napaulense* Choisy in DC. Prodr. 552. 1824.

多年生草本,高0.2—0.4米,全体无毛;根茎具发达的侧根及须根。茎数枚丛生,直立或下部依地而上升,圆柱形,无腺点,单一或上部分枝,分枝有花序。叶近无柄;叶片披针状长圆形至长圆形,长2—5.5厘米,宽0.5—1厘米,先端钝形或近圆形,基部浅心形而略抱茎,全缘,坚纸质,上面绿色,下面淡绿色,边缘疏生黑色腺点,全面散布多数透明松脂状腺点,侧脉每边约3条,斜升,与中脉在上面略凹陷,下面凸起,脉网稀疏,下面明显可见。花序于茎及分枝上顶生,为多花蝎尾状二歧聚伞花序,苞片及小苞片为卵状披针形至长圆状披针形,长3—6毫米,全面散布松脂状腺条,边缘有小刺齿,齿端有黑色腺体。萼片卵状或长圆状披针形,长约6毫米,宽3毫米,先端锐尖,全面有松脂状腺条,边缘有小刺齿,齿端有黑色腺体。花瓣倒卵状长圆形,长约15毫米,宽4毫米,先端钝形,上部边缘具黑色腺点,有时尚有黑腺条。雄蕊3束,每束具雄蕊约20枚,花丝长0.8—1.1厘米,花药黄色,有黑色腺点。子房卵珠形,长约4毫米;花柱3,长约为子房的2倍或2倍以上,自基部分离,叉开。蒴果卵珠形,长约5毫米,宽4毫米,成熟时褐色,外密布腺纹。种子黄褐色,圆柱形,长约0.7毫米,一侧有不明显的棱状突起,顶端无附属。花期7—8月,果期9—10月。

产江西、福建、湖北、湖南、广东、贵州、云南、西藏。生于山坡草丛、灌丛、林下及田埂上,海拔750—3200米。克什米尔地区、锡金、尼泊尔、印度、缅甸也有。模式标本采自尼泊尔。

43. 衡山金丝桃 (东北林学院植物研究室汇刊)

Hypericum hengshanense W. T. Wang in Bull. Bot. Lab. North-East. Forest. Inst. No.5:27. 1979.

多年生草本,无毛。茎直立,高62—100厘米,多分枝,茎及分枝圆柱形,其上有短分枝,分枝长1—8厘米。叶无柄,叶片长圆状披针形,长4—6厘米,宽1.2—1.6厘米,先端钝,基部宽楔形,稍斜,具有腺的长睫毛,纸质,上面深绿色,干时变褐色,下面淡绿色,沿边缘有黑色腺点,全面散布透明腺点,侧脉约2对,与中脉在上面凹陷,下面明显隆起。聚伞花序顶生,直径约7厘米,有3—5花;苞片无柄,线状披针形或线形,长5—10毫米,宽



1—2. 遍地金(原亚种) *Hypericum wightianum* Wall. ex Wight et Arn. subsp. *wightianum*: 1. 植株, 2. 花, 前面萼片、花瓣及雄蕊已除去。 3—7. 挺茎遍地金 *H. elodeoides* Choisy: 3. 植株, 4. 花, 外面观, 5. 花, 前面萼片、花瓣及雄蕊已除去, 6. 雄蕊, 7. 花瓣。(肖裕绘)