

叶同形,长达0.5厘米。花直径1.5厘米,近平展;花梗长1.5—3毫米。萼片卵状披针形,长约2.5毫米,宽不及1毫米,先端锐尖,全缘,边缘及全面具黑腺点。花瓣黄色,倒卵状长圆形,长约7毫米,宽2.5毫米,上半部有黑色点线。雄蕊3束,宿存,每束有雄蕊8—10枚,花药具黑色腺点。子房卵珠形,长约3毫米,宽1毫米;花柱3,自基部离生,与子房等长。蒴果卵珠形,长约10毫米,宽4毫米,具纵向条纹。种子绿褐色,圆柱形,长约0.7毫米,两侧具龙骨状突起,无顶生附属物,表面有细蜂窝纹。花期7—8月,果期8—9月。

产江苏、安徽、浙江、福建、台湾、湖北、湖南。生于山坡草丛中。苏联(库页岛)、朝鲜及日本也有。模式标本采自日本。

46. 短柄金丝桃 (台湾植物志)

Hypericum pseudopetiolatum R. Keller in Bull. Herb. Boiss. 5:638. 1897; Y. Kimura in Journ. Bot. 15:295. 1939, pro parte excl. var. *kusianum* et in Nakai & Honda, Nova Fl. Japon. 10:197, f. 68, 69. 1951; 台湾植物志 2: 640, pl. 432. 1976. — *H. taihezanense* Sasaki ex S. Suzuki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa 20: 239. 1930, in Ann. Rep. Taihoku Bot. Gard. 1:158. 1930, et in Masamune, Short Fl. Formosa 4. 1936. — *H. pseudopetiolatum* R. Keller var. *taihezanense* (Sasaki ex S. Suzuki) Y. Kimura in Journ. Jap. Bot. 15:269. 1939, in Bot. Mag. Tokyo 54:81. 1940, et in Nakai & Honda, Nova Fl. Japon. 10:204. 1951.

多年生草本,高(0.1—)0.15—0.4(—0.7)米;根茎多少匍匐并生根,不分枝或向上多少分枝。茎自根茎生出,直立或依地上升,单一或多少丛生,圆柱形,无腺点。叶无柄或具短柄,叶柄长达1毫米;叶片三角状披针形或卵状长圆形至长圆形或椭圆形或倒披针形,长0.4—3.6(—4)厘米,宽0.3—1.4厘米,先端圆形,基部心形抱茎而渐狭,坚纸质,下面淡绿色或灰白色,侧脉3—7对,上升,脉网细而稀疏,近边缘有较密的黑色腺点,全面散布大小不一的淡色腺点。花序1至多花,近伞房状至圆锥形,后者包括侧生的花枝。花直径5—10毫米,内凹;花蕾椭圆形,先端钝形。萼片披针形至狭长圆形或线形,长2.5—6毫米,宽0.8—1.5毫米,先端钝形至圆形,全缘,边缘密生黑色有时亦有淡色的腺点,全面有少数腺点或多少伸长的腺条,果时上升。花瓣黄色,倒卵状长圆形,长(3—)5—6(—8)毫米,宽2—3.5毫米,宿存,近顶端或上半部边缘有小而黑色无柄至具柄的腺体,全面有少数或无淡色腺点或腺条。雄蕊3束,宿存,每束有雄蕊7—10枚,花药黄色,有黑色腺点。子房卵珠形,长1.5—3毫米,3室;花柱3,或长或短,长1—2毫米,离生,自基部开张或上升。蒴果卵珠形至近圆球形,长3.5—6.7(—7)毫米,宽3—4.5毫米,有纵腺条纹。种子黑褐色,长0.5—0.6毫米,两侧无龙骨状突起,顶端无附属物,表面有细蜂窝纹。

产台湾(台北、宜兰、新竹、南投、台东、花莲)。生于路旁、开旷地、草坡、山坡及林缘,海拔1000—3000米。日本(北至北海道)、菲律宾(吕宋岛)也有。模式标本采自台湾(Tsurugizan 附近林中,海拔500—1000米)。