

47. 扬子小连翘 (中国高等植物图鉴补编第二册) 过路黄(贵州盘县), 肝红(四川眉山) 图版 14: 5—8

Hypericum faberi R. Keller in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, **21**: 179. 1925, nom.; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 402. 1931, descr.

多年生草本, 高 0.2—0.8 米。茎曲膝状或匍匐状上升, 圆柱形, 多分枝。叶具柄, 叶柄长 1—3 毫米; 叶片卵状长圆形至长圆形, 长 1—2.5 厘米, 宽 0.6—0.8 厘米, 先端钝形或锐尖, 基部宽楔形至圆形, 边缘全缘, 扁平或略背卷, 上面绿色, 下面淡绿色, 边缘生有黑腺点, 全面散布淡色透明腺点, 侧脉每边 2—3 条, 自中脉中部以下生出, 向上弧曲而连结, 与中脉在上面微凹, 下面凸起, 脉网稀疏, 下面隐约可见。花序于茎及分枝上顶生, 5—7 花, 蝎尾状二歧聚伞花序; 苞片及小苞片线形或线状披针形, 长约 3 毫米, 边缘疏生黑腺点。花直径 5 毫米, 近平展; 花梗长 1.5—3 毫米。萼片倒卵状长圆形, 长 1.5—2 毫米, 宽约 0.8 毫米, 先端稍钝, 基部楔形, 边缘常疏生黑色腺点, 全面有淡色腺点或腺条。花瓣黄色, 倒卵状长圆形, 长约 6 毫米, 宽 3 毫米, 先端钝形, 全面无黑腺点或仅在先端具少数黑腺点, 宿存。雄蕊 3 束, 每束有雄蕊 7—8 枚, 花丝与花瓣约等长, 花药黄色, 有黑色腺点。子房卵珠形, 长约 1.5 毫米, 1 室; 花柱 3, 长约 2 毫米, 自基部分离, 叉开。蒴果卵珠形, 长 5—6 毫米, 宽 3.5—4 毫米, 成熟时褐色, 具纵腺条纹。种子黄褐色, 圆柱形, 长约 0.5 毫米, 两端锐尖, 两侧无龙骨状突起, 顶端无附属物, 表面有不明显的细蜂窝纹。花期 6—7 月, 果期 8—9 月。

产陕西、安徽、湖南、广西、四川、贵州、云南(东北部)。生于山坡草地、灌丛、路旁或田埂上, 海拔 1100—2600 米。合模式标本采自湖南新化锡矿山及云南大关成风山。

48. 短柄小连翘 (新拟)

Hypericum petiolulatum Hook. f. et Thoms. ex Dyer in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **1**: 255. 1874; N. Robson in Blumea **20**(2): 261. 1972. — *H. petiolulatum* Hook. f. var. *orbiculatum* Franch. in Bull. Soc. Bot. France **33**: 437. 1886, Pl. Delav. 103. 1889; Lév. in Bull. Soc. Bot. France **54**: 594. 1908. — *H. petiolatum* sensu R. Keller in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, **21**: 179. 1925 (orth. mut. vice *H. petiolulatum*). — *H. thomsonii* R. Keller in Engl. Bot. Jahrb. **33**: 552. 1904, pro parte quoad typum.

48a. 短柄小连翘 (原亚种) 图版 14: 1—4

subsp. *petiolulatum*

多年生草本, 高 0.25—0.3 米, 全体无毛。茎圆柱形, 多少铺散, 多分枝, 分枝细弱而能育。叶远离, 具柄, 叶柄长约 1 毫米; 叶片卵形至倒卵形, 长 0.6—1.4 厘米, 宽 0.4—0.8 厘米, 最宽处在叶片中部或中部以上, 先端钝形, 基部宽楔形或渐狭, 边缘全缘, 波状, 上面绿色, 下面淡绿色, 边缘生有黑腺点, 全面散生淡色腺点。花序顶生, 聚伞状, 除顶生单花外