

期 7—8 月,果期 9—10 月。

产河北、山西、陕西、甘肃、新疆、山东、江苏、江西、河南、湖北、湖南、四川及贵州。生于山坡、路旁、草地、林下及河边等处,海拔 500—2100 米。南欧、塞浦路斯、非洲西北部、近东、中亚、印度至蒙古和苏联也有。模式标本采自欧洲。

51. 赶山鞭 (中国高等植物图鉴) 小茶叶(山东、江苏),小金钟、小金丝桃、小叶牛心菜、紫草、胭脂草(山东),女儿茶、小金雀、小旱莲(江苏),二十四节草(浙江),打字草、香龙草(安徽),小便草(东北),乌腺金丝桃(东北植物检索表、东北草本植物志) 图版 15:5—8

Hypericum attenuatum Choisy, Prodr. Hyperic. 47, t. 6. 1812, in DC. Prodr. 1:548. 1824; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. 23:72. 1886; Kom. Fl. Manch. 3:43. 1905; Lév. in Bull. Soc. Bot. France 54:595. 1907; Nakai, Fl. Kor. 1:95. 1909; Kitag. Fl. Mandsch. 317. 1939; Gorschk. in Schischk. et Bobr. Fl. URSS 15:236. 1949; 东北植物检索表 224, pl. 71, f. 3. 1959; 中国高等植物图鉴 2: 875, f. 3480. 1972; 东北草本植物志 6: 73, pl. 28, f. 1—4. 1977。

多年生草本,高(15—)30—70 厘米;根茎具发达的侧根及须根。茎数个丛生,直立,圆柱形,常有 2 条纵线棱,且全面散生黑色腺点。叶无柄;叶片卵状长圆形或卵状披针形至长圆状倒卵形,长(0.8—)1.5—2.5(—3.8)厘米,宽(0.3—)0.5—1.2 厘米,先端圆钝或渐尖,基部渐狭或微心形,略抱茎,全缘,两面通常光滑,下面散生黑腺点,侧脉 2 对,与中脉在上面凹陷,下面凸起,边缘脉及脉网不明显。花序顶生,多花或有时少花,为近伞房状或圆锥花序;苞片长圆形,长约 0.5 厘米。花直径 1.3—1.5 厘米,平展;花蕾卵珠形;花梗长 3—4 毫米。萼片卵状披针形,长约 5 毫米,宽 2 毫米,先端锐尖,表面及边缘散生黑腺点。花瓣淡黄色,长圆状倒卵形,长 0.8—1.2 厘米,宽约 0.4 厘米,先端钝形,表面及边缘有稀疏的黑腺点,宿存。雄蕊 3 束,每束有雄蕊约 30 枚,花药具黑腺点。子房卵珠形,长约 3.5 毫米,3 室;花柱 3,自基部离生,与子房等长或稍长于子房。蒴果卵珠形或长圆状卵珠形,长 0.6—1.0 毫米,宽约 4 毫米,具长短不等的条状腺斑。种子黄绿、浅灰黄或浅棕色,圆柱形,微弯,长 1.2—1.3 毫米,宽约 0.5 毫米,两端钝形且具小尖突,两侧有龙骨状突起,表面有细蜂窝纹。花期 7—8 月,果期 8—9 月。

产黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山西、陕西、甘肃、山东、江苏、安徽、浙江、江西、河南、广东、广西(北部)。生于田野、半湿草地、草原、山坡草地、石砾地、草丛、林内及林缘等处,海拔在 1100 米以下。苏联(西伯利亚东部及远东地区)、蒙古、朝鲜及日本也有。模式标本采自苏联达乌里亚。

民间用全草代茶叶用;全草又可入药,捣烂治跌打损伤或煎服作蛇药用。

52. 能高金丝桃 (台湾植物志)

Hypericum nokoense Ohwi in Acta Phytotax. Geobot. 6:48. 1937; Y. Kimura in Bot. Mag. Tokyo 54:85, f. 4. 1940, in Nakai & Honda, Nova Fl. Japon. 10:

226, f.76(5). 1951; 台湾植物志 2: 639. 1976.

多年生草本, 自匍匐根茎上升或近直立, 高 5—10 厘米; 根茎向下生根, 向上分枝或不分枝。茎多少丛生, 有时形成垫状, 具 2 及 4 纵线棱, 或有时变为近圆柱形, 无腺点。叶无柄或具短柄, 叶柄长 0—1 毫米; 叶片卵形至椭圆形或狭长圆形或倒卵形, 长 0.4—1.2 厘米, 宽 0.15—0.6 厘米, 先端圆形, 基部心形至楔状渐狭, 全缘, 近膜质, 上面绿色, 下面明显灰白色且有时具乳突, 有 2—3 对上升的侧脉, 但无明显可见的脉网, 近边缘有黑腺点, 全面或多或少散布有淡色或黑淡色相混的大小不一的腺点。聚伞花序具 1—5(—7) 花, 近伞房状, 无腋生花枝。花直径 1.2—1.8 厘米, 多少平展; 花蕾卵珠形至椭圆形, 先端锐尖。萼片披针形至狭长圆形, 长 3—5 毫米, 宽 0.8—1.2 毫米, 先端锐尖至近锐尖, 全缘, 沿边缘之内方有规则排列的黑腺点, 全面散布淡色及黑色腺点或腺条, 果时直立。花瓣黄色, 倒卵形或长圆状披针形至披针形, 长 7—11 毫米, 宽 2—3(—4.5) 毫米, 无边缘腺点, 宿存。子房长约 2 毫米, 3 室; 花柱 3, 长 4—6 毫米, 自基部分离。蒴果狭卵珠形, 长 6—7 毫米, 宽 4 毫米, 有纵腺条。种子未见。 花期 7—8 月, 果期 8—9 月。

产台湾(南投、花莲)。生于山坡上, 海拔 1800—1900 米。模式标本采自台湾花莲能高山。

53. 玉山金丝桃 (台湾植物志)

Hypericum nagasawai Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 30(1):38. 1911, Icon. Pl. Formosa 1:81, pl.18. 1911; Suzuki in Masamune, Short Fl. Formosa 4. 1936; Y. Kimura in Bot. Mag. Tokyo 54:82, f.1. 1940, in Nakai & Honda, Nova Fl. Japon. 10:225, f.75, 76(1). 1951; 台湾植物志 2: 636, pl. 431. 1976. — *H. randaiense* Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 30(1):39. 1911; Suzuki in Masamune, Short Fl. Formosa 141. 1936; Y. Kimura in Bot. Mag. Tokyo 54:84, f.1. 1940 et in Nakai & Honda, Nova Fl. Japon. 10:226, f.75, 76(3). 1951. — *H. nagasawai* Hayata var. *typicum* Y. Kimura in Bot. Mag. Tokyo 54:82. 1940 et in Nakai & Honda, Nova Fl. Japon. 10:225. 1951. — *H. nagasawai* Hayata var. *nigrum* Y. Kimura in Bot. Mag. Tokyo 54:82. 1940 et in Nakai & Honda, Nova Fl. Japon. 10:227, f.76(6). 1951. — *H. hayatae* Y. Kimura in Bot. Mag. Tokyo 54:85, f.5. 1940 et in Nakai & Honda, Nova Fl. Japon. 10:228, f.76(2). 1951. — *H. suzukiianum* Y. Kimura in Bot. Mag. Tokyo 54:86, f.6. 1940, in Nakai & Honda, Nova Fl. Japon. 10:228, f.76(2). 1951. — *H. taiwanianum* Y. Kimura var. *ohwi* Y. Kimura in Nakai & Honda, Nova Fl. Japon. 10:228. 1951. — *H. attenuatum* auct. non Choisy: Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 25(19):59. 1908.

多年生草本, 高 5—35 厘米; 根茎匍匐, 向下生根, 不分枝或分枝。茎单一或近丛生, 上升或近直立, 具 2 及 4 纵线棱, 无腺点。叶无柄或近无柄; 叶片卵形或长圆形至椭圆