

被宿存的花萼所包被,黑褐色,无毛。种子每室 6—8 颗,倒卵形,长约 7 毫米,宽 3 毫米,基部狭爪状,不对称,一侧具翅。花期 3—4 月,果期 5 月以后。

产海南。生于灌丛中,海拔 600 米以下。自泰国、老挝、柬埔寨,经越南、马来西亚、印度尼西亚至菲律宾也有分布。模式标本采自印度尼西亚的苏门答腊。

2b. **红芽木** (广西) 土茶(广西),牛丁角(云南盈江)、黄浆果(屏边)、苦沅茶、红眼树(河口),酸浆树、苦丁茶(云南) 图版 17: 5—9

subsp. **pruniflorum** (Kurz) Gogelin in *Blumea* **15**(2):469. 1967; Biswas in *Bull. Bot. Surv. India* **15**:167. 1976. — *Tridesmis pruniflora* Kurz in *Journ. Asiat. Soc. Bengal.* **41**(2):293. 1872. — *Cratoxylon pruniflorum* Kurz in *Journ. Asiat. Soc. Bengal.* **43**(2):84. 1874 et *For. Fl. Brit. Burma* **1**:84. 1877; Dyer in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* **1**:258. 1874 ('prunifolium'); Pierre, *Fl. For. Coch.* **1**:t. 52. 1882 ('prunifolium'); Gagnep. *Not. Syst.* **1**:19. 1909 et in *Lect. Fl. Gén. Indo-Chine* **1**:289. 1910 ('prunifolium'); Craib, *Fl. Siam. Enum.* **1**:113. 1925; 中国高等植物图鉴 **2**: 882, f. 3493. 1976.

与原亚种不同在于幼枝、叶、花梗及萼片外面密被柔毛。

产广西南部、云南南部。生于山地次生疏林或灌丛中,海拔 1400 米以下。缅甸、泰国、柬埔寨及越南也有。模式标本采自缅甸的毛淡棉。

木材带红色,坚硬,纹理精致,宜作细工;树皮入药,煎水治牛马肠胃炎有效;嫩叶又可作茶叶代用品。

2. 红厚壳亚科——CALOPHYLLOIDEAE ENGL.

Engl. in Engl. u. Prantl, *Nat. Pflanzenfam.* **3**(6):218. 1895.

叶对生;花两性或单性,同株稀异株,雄蕊多数,分离或基部合生,子房 1—4 室,每室有胚珠 1—2;果不开裂;子叶大而厚。

约 4 属,主要分布于亚洲热带地区,其次是非洲西部和马达加斯加;少数到热带美洲。我国有 3 属,产西南、华南。

4. 铁力木属*——*Mesua* Linn.

Linn. *Sp. Pl.* ed.5,591. 1754; Choisy in DC. *Prodr.* **1**:562. 1824;

Engl. in Engl. u. Prantl, *Nat. Pflanzenfam.* **3**(6):218. 1895.

乔木。叶硬革质,通常具透明斑点,侧脉极多数,纤细。花两性,稀杂性,通常单生叶腋,有时顶生;萼片和花瓣 4,覆瓦状排列;雄蕊多数,花丝长,丝状,分离,花药直立,底着,

* 铁力木属(中国种子植物科属辞典,拉汉种子植物名称)。