

滑,棕褐色。花期3—5月,果期8—11月。

产云南南部和西南部至西部(尤以南部西双版纳分布较集中)及广西西南部(零星分布),广东有引种栽培。生于沟谷和丘陵地潮湿的密林中,海拔(100—)600—1000(—1400)米。喜马拉雅山东部,孟加拉东部经缅甸、泰国至中南半岛及安达曼岛也有,日本有引种栽培。模式标本采自孟加拉东部。

果成熟后可食用,其味较酸;种子含油量17.72%,可作工业用油;黄色树脂滴入鼻腔,可驱使蚂蝗自行退出(西双版纳傣药志)。

过去有的学者将 *Garcinia pictoria* Roxb. (Fl. Ind. 2:627. 1824.) 归并入本种中,但该种花4数,单生,无花梗,柱头4裂,果具4稜而有较大差别,属瘤柱组 (Sect. *Hebradendron* (Grah.) Planch. et Triana) 应予分开。

2. 菲岛福木 (台湾植物志) 福木(本多造林学各论),福树(中国树木分类学) 图版21:4—7

*Garcinia subelliptica* Merr. in Philipp. Journ. Sci. 3: 261. 1908 et Enum. Philipp. Fl. Pl. 3: 86. 1923; 台湾植物志 2:625, tab. 428. 1976. — *G. spicata* auct. non Hook. f.: Liou, Ill. Nat. Intr. Lign. Pl. Taiwan 1:300, tab. 257. 1960; 中国树木分类学 845, 图 739. 1960; H. L. Li, Woody Fl. Taiwan 601, tab. 236. 1963.


乔木,高可达20余米,小枝坚韧粗壮,具4—6稜。叶片厚革质,卵形,卵状长圆形或椭圆形,稀圆形或披针形,长7—14(—20)厘米,宽3—6(—7)厘米,顶端钝、圆形或微凹,基部宽楔形至近圆形,上面深绿色,具光泽,下面黄绿色,中脉在下面隆起,侧脉纤细,微拱形,12—18对,两面隆起,至边缘处联结,网脉明显;叶柄粗壮,长6—15毫米。花杂性,同株,5数;雄花和雌花通常混合在一起,簇生或单生于落叶腋部,有时雌花成簇生状,雄花成假穗状,长约10厘米;雄花萼片近圆形,革质,边缘有密的短睫毛,内方2枚较大,外方3枚较小;花瓣倒卵形,黄色,长约为萼片的2倍多,雄蕊合生成5束,每束有6—10枚,束柄长约2毫米,花药双生;雌花通常具长梗,退化雄蕊合生成5束,花药萎缩状,副花冠上半部具不规则的啮齿;子房球形,外面有稜,3—5室,花柱极短,柱头盾形,5深裂,无瘤突。浆果宽长圆形,成熟时黄色,外面光滑,种子1—3(—4)枚。

产我国台湾南部(高雄和火烧岛),台北市亦见栽培。生于海滨的杂木林中。日本的琉球群岛、菲律宾、斯里兰卡、印度尼西亚(爪哇)也有。模式标本采自菲律宾。

本种能耐暴风和怒潮的侵袭,根部巩固,枝叶茂盛,是我国沿海地区营造防风林的理想树种。

本种的花杂性,同株,5基数,但也有的文献(Vesque in DC. Monogr. Phanerog. 8:310. 1893; H. L. Li, Woody Fl. Taiwan 602, tab. 236. 1963) 记载为4基数,更甚者出现文图自相矛盾的情况。

3. 木竹子 (本草纲目拾遗) 多花山竹子(海南植物志),山竹子(中国树木分类学),



1—3.大叶藤黄 *Garcinia xanthochymus* Hook. f. ex T. Anders.: 1.叶, 2.两性花, 3.果实。4—7.菲岛福木 *G. subelliptica* Merr.: 4.花枝, 5.果枝一段, 6.雄花, 7.除去花被后的