

11. 广西藤黄 (植物分类学报) 广西山竹子(广西植物名录)、春杧果(上思) 图版 25: 4—5

*Garcinia kwangsiensis* Merr. ex F. N. Wei in Acta Phytotax. Sin. 19(3): 355, tab. 1:1. 1981.

小乔木, 高约 6 米。小枝干后微具纵稜, 略带红褐色。叶片薄革质, 椭圆形至椭圆状披针形, 长 8—14 厘米, 宽 2—4 厘米, 顶端渐尖或急尖, 基部楔形, 微下延, 干时棕褐色, 中脉在上面下陷, 背面隆起, 侧脉纤细, 密集, 30—45 对, 至边缘处连接, 网脉几不明显; 叶柄长 1—1.5 厘米。花杂性, 异株; 雄花 (1—)2—4 朵簇生叶腋, 直径约 5 毫米, 花梗长 1—2 毫米; 萼片 2 大 2 小, 卵形, 肉质, 长 1.5—2 毫米; 花瓣几等大, 卵形或倒卵形, 长约 3 毫米, 雄蕊合生成 4 束, 短于退化雌蕊, 束柄短, 与花瓣基部联合, 开放时随花瓣平展, 每束具花药 60—70 枚, 退化雌蕊具肥大的柱头, 蘑菇状, 顶端微具瘤突。雌花和果实未见。花期 6—7 月。

产广西南部。生于山坡杂木林中, 海拔 600 米。模式标本采自广西上思县十万大山。


本种的特征在于叶片的侧脉纤细而密集, 多达 45 对, 网脉几不明; 雄花 (1—)2—4 朵簇生叶腋, 雄蕊束与花瓣基部联合, 开放时随花瓣平展等与本属其他种相区别。

12. 怒江藤黄 (植物分类学报) 歇第(怒江独龙语), 捧咖昔、哇咖扑昔(德宏景颇语) 图版 26

*Garcinia nujiangensis* C. Y. Wu et Y. H. Li in Acta Phytotax. Sin. 19(4): 494, fig. 4. 1981.

乔木, 高 10—15 米, 胸径 20—30 厘米; 树皮灰褐色。枝条具纵沟槽, 灰褐色或棕褐色, 不具皮孔。叶片坚纸质, 披针形, 卵状披针形或长圆状披针形, 长 10—13(—18) 厘米, 宽 3—5 厘米, 顶端渐尖, 基部楔形; 中脉两面隆起, 侧脉 12—15 对, 弯拱, 至边缘处联结, 在下面明显隆起, 第三次小脉几平行, 不成网状; 叶柄长 6—12 毫米。花杂性, 异株。雄花序为极短的聚伞状, 长不到 1 厘米, 花序 2—3 腋生, 总梗长约 2 毫米, 粗壮, 每个聚伞花序着花 6—8 朵或更多; 花梗长 1—2 毫米; 花萼裂片外方 2 枚较厚, 肉质, 内方 2 枚较薄, 均边缘膜质, 近圆形, 几等大; 花瓣淡黄色, 倒卵形, 几等大, 比萼片稍小; 能育雄蕊的花丝联合成 4 束, 每束有花药 50—60 枚, 退化雌蕊倒卵形, 柱头盾形, 边缘具不规则的裂口。雌花序 2—3 歧聚伞状, 腋生, 总梗极短, 长约 3—4 毫米, 基部苞片宿存; 花梗长 1.5—2 厘米, 具沟槽; 雌蕊高 6—8 毫米, 中部膨大, 柱头盾形, 4 裂, 无乳头状瘤突, 子房 1 室, 胚珠 1; 退化雄蕊的花丝联合成 1 轮, 包围雌蕊, 花药 20—25。果成熟时圆球形、椭圆球形或卵球形, 长 2.5—3 厘米, 淡黄色, 柱头宿存, 有时偏斜, 种子 1。花期 12 月至翌年 2 月, 果期 8—9 月。

产云南西部(盈江、陇川)、西北部(贡山)及西藏东南部(墨脱)。生于山坡或沟谷的密林中, 海拔 (800—)1100—1700 米。模式标本采自云南贡山。



1—3.大果藤黄 *Garcinia pedunculata* Roxb., 1.果枝, 2.除去花被后的雄花, 3.除去花被后的雌花。 4—5.广西藤黄 *G. kwangsiensis* Merr. ex F. N. Wei, 4.叶, 5.雄花。(刘怡涛绘)