

本种近 *Garcinia stipulata* T. Anders., 但叶脉多, 不成网状, 花双生而不同。

13. 云树 (中国树木分类学) 云南山竹子 (中国高等植物图鉴), 给哈蒿 (云南西双版纳傣语) 图版 23: 6—8


*Garcinia cowa* Roxb., Hort. Beng. 42.1814. nom. nud., Fl. Ind. 2:622. 1824; Choisy in DC. Prodr. 1:561. 1824; Planch. et Triana in Ann. Sci. Nat. ser. 4, 14: 186 et 341.1860; T. Anders. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1:262. 1874; Kurz, For Fl. Brit. Burma 1:90. 1877; Pierre, Fl. For. Cochinch. Enum. 28. Pl. 82. 1885-88; Vesque in DC. Monogr. Phanerog. 8:449. 1893; Craib in Fl. Siam. Enum. 1:114.1931; Gagnep. in Humb. Suppl. Fl. Gén. Indo-Chine 1:261. 1943; 中国树木分类学 845. 1960; 中国高等植物图鉴 2:884. 图 3498. 1972; Whitm., Tree Fl. Mal. 2:208.1973. — *G. roxburghii* Wight Illustr. 1:125.1840. — *G. wallichii* Choisy in Mem. Soc. Phys. Genev. 12:417. 1851. p. p. — *G. yunnanensis* Hu in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. Bot. 10(3): 131. 1940, excl. typis — *Oxycarpus gangetica* Buch.-Ham. in Mem. Wern. Soc. Trans. 5:344. 1824.

乔木, 高 8—12 米, 胸径 15—20 厘米; 树皮暗褐色; 树冠圆锥形, 分枝多而细长, 密集于树干顶端, 平伸, 先端通常下垂, 小枝暗褐色, 具纵条纹。叶片坚纸质, 披针形或长圆状披针形, 长 6—14 厘米, 宽 2—5 厘米, 顶端渐尖或长渐尖, 稀急尖或钝, 基部楔形, 有时微下延, 中脉在上面下陷, 下面隆起, 侧脉 12—18 对, 网脉两面明显; 叶柄长 0.8—1.5 (—2) 厘米。花单性, 异株。雄花 3—8, 顶生或腋生, 伞形排列, 总梗极短, 有时近无梗而成簇生状, 基部具钻形苞片 4; 花梗纤细, 长 4—8 毫米; 花瓣黄色, 长约为萼片的 2 倍, 雄蕊多数, 约 40—50 枚, 花丝合生成 1 束, 束柄头状, 有时少部份花药具短的花丝, 无退化雌蕊。雌花通常单生叶腋, 比雄花大; 花梗粗壮, 长 2—3 毫米; 退化雄蕊下半部合生, 包围子房的基部, 花丝或长或短, 通常短于子房; 子房卵球形, 4—8 室, 柱头辐射状分裂, 上面具乳头状瘤突, 高 6—7 毫米, 外面具 4—8 棱。果成熟时卵球形, 直径 4—5 厘米, 暗黄褐色, 外面具沟槽 4—8 条, 果顶端通常突尖, 偏斜; 成熟种子 2—4, 狭长, 纺锤形, 微弯, 表面凹凸不平, 长约 2.5 厘米。花期 3—5 月, 果期 7—10 月。

产云南南部 (西双版纳州和思茅部份地区), 西南部 (临沧), 西部 (德宏州) 以及东南部 (红河州)。生于沟谷、低丘潮湿的杂木林中, 海拔 (150—) 400—850 (—1300) 米。印度, 孟加拉东部 (吉大港) 经中南半岛至马来群岛和安达曼群岛也有。模式标本采自孟加拉吉大港。

果成熟后味酸甜, 可食用; 种子含油量约为 9.37%。

14. 岭南山竹子 (海南植物志) 海南山竹子 (广州植物志), 岭南倒捻子 (中国树木分类学), 金赏, 罗蒙树, 酸桐木, 黄牙桔, 严芽桔, 竹节果 (广东), 黄牙树 (香港), 赤过, 麦芽仔, 鸠酸, 山竹子, 粘牙仔 (海南)



1—5. 云南藤黄 *Garcinia yunnanensis* Hu: 1. 雌花枝, 2. 雌花, 3. 花瓣, 4. 子房横剖面, 5. 雄花。 6—8. 云树 *G. cowa* Roxb.: 6. 雌花枝, 7. 雄花, 8. 雌花。(刘怡涛绘)