

乔木,高 15—20 米。枝条灰褐色,具细纵条纹,有时具皮孔。叶片纸质,椭圆形、卵状椭圆形或长圆状椭圆形,长 12—18(—20) 厘米,宽 4—7 厘米,顶端急尖或钝渐尖,基部楔形,微下延,下面淡褐色,中脉在两面隆起,侧脉排列整齐,8—10 对,网脉较密,但不明显;叶柄长 1—1.5 厘米。花单性,异株。雄花序聚伞状,长约 2 厘米,1—3 着生于嫩枝顶端;总梗粗壮,具明显的关节,长 8—10 毫米,着花 2—3;花梗粗壮,长 5 毫米以下;萼片 2 大 2 小,倒卵形或扁圆形;花瓣淡黄色,3 枚等大,内方 1 枚最小,椭圆形或长圆形;雄蕊多数,花丝聚合成 1 束,束柄头状,花药扁,形状各式,2 室,纵裂,无退化雌蕊。雌花通常单生于嫩枝顶端,比雄花大,直径约 1 厘米;退化雄蕊的花丝联合,包围子房基部,子房圆球形,8—12 室,柱头全缘,具多数乳头状瘤突,高 1—1.2 厘米,外面具 6—8 棱。果大,成熟时卵球形,稀扁球形,长 5—9 厘米,橙黄色,外面有沟槽 6—8(—11) 条,柱头宿存;成熟种子 2—4,微菱形或斜卵形,外面光滑,长 2.5—3 厘米。花期 8—10 月,果期 6—8 月。

产云南西部(盈江、瑞丽、陇川)及西北部(贡山)。生于山谷杂木林中,海拔(860—)1300—1650 米。模式标本采自云南瑞丽。

本种近 *Garcinia cambogia* Desr., 但本种雄花不具退化雌蕊;雄蕊多数,几无花丝;柱头全缘,具多数瘤突。

成熟果外形酷似酸木瓜,故得名,可食用,汁多而味酸甜。

19. 双籽藤黄 (植物分类学报) 黄皮果(云南景洪) 图版 27: 3—5。

***Garcinia tetralata* C.Y. Wu ex Y.H. Li in Acta Phytotax. Sin. 19(4):492. fig. 2:3—5. 1981.**

乔木,高 5—8 米,稀达 15 米,胸径约 15 厘米。分枝通常下垂,枝条淡绿色,有纵棱。叶片坚纸质,椭圆形或狭椭圆形,稀卵状椭圆形,长 8—13(—15) 厘米,宽 3—6 厘米,顶端急尖或短渐尖,基部楔形,微下延,中脉在上面下陷,下面隆起,侧脉 13—16 对,两面隆起,纤细,斜伸至边缘处网结,第三次脉网状;叶柄长 0.8—1.2 厘米。花未见。果单生叶腋或落叶腋部,圆球形,成熟时直径 2—2.5 厘米,外面光滑,近无柄,柱头宿存,4 裂,每裂片具乳头状瘤突 4—5,果实有种子 2。果期 5 月。

产云南南部(景洪)和西南部(沧源,耿马)。生于低丘、平坝杂木林中,海拔 800—1000 米。模式标本采自云南沧源。

本种近 *Garcinia anomala* Planch. et Triana, 但不具叶状苞片,柱头 4 裂,每裂片上面具瘤突 4—5,果实具种子 2。

20. 长裂藤黄 (植物分类学报)

***Garcinia lancilimba* C.Y. Wu ex Y.H. Li in Acta Phytotax. Sin. 19(4):493. fig. 3. 1981.**

小乔木,高 3—6 米。分枝下垂,老枝具纵棱,嫩枝纤细,四棱形,灰黄色。叶片坚纸质,卵状披针形,长圆状披针形或披针形,长 6—10 厘米,宽 (1.5—)2—3.5 厘米,顶端长渐



1—2. 红萼藤黄 *Garcinia rubrisepala* Y. H. Li: 1. 雄花枝, 2. 雄花。 3—5. 双籽藤黄 *G. tetralata* C. Y. Wu ex Y. H. Li: 3. 果枝, 4. 果顶端宿存的柱头, 5. 果实横剖面, 示具 2 个种子。(刘怡涛绘)