

尖或尾尖,钝头,基部楔形或渐狭,下面淡绿色,中脉两面隆起,侧脉密集,20—30对,斜升,至边缘处联结,网脉隐约可见;叶柄长2—4(—6)毫米。花杂性,同株,通常单生或有时成对,腋生,开放时直径约4毫米,淡黄色;花梗长约6毫米;花被裂片几相等;雄蕊4束,束柄短;子房近圆球形,2室,柱头盾形,全缘,凸起,上面光滑,高过于雄蕊束。果圆球形,成熟时直径约1—1.5厘米,2室,成熟种子1—2,果外面光滑,柄长5—8毫米。花期4—5月,果期2—4月。

产云南南部。生于低丘、荫坡、潮湿的沟谷密林下,海拔600—1000(—1750)米。模式标本采自云南景洪。

本种与越南北部产的 *Garcinia bonii* Pitard 相近,但花梗较长,柱头全缘,凸起,无瘤突,子房2室而不同。

21. 兰屿福木 (台湾植物志)

Garcinia linii C. E. Chang in Journ. For. Ass. Taiwan, Prov. Inst. Agric. Pingtung 6:1, tab. 1. 1964; Hatusima in Mem. Fac. Agric. Kagohima Univ. 7:317. 1970; 台湾植物志 2:624. 1976. — *G. subelliptica* auct. non Merr. Liu, Sasaki et Keng in Quart. Journ. Taiwan Mus. 5:308. 1955. — *G. multiflora* auct. non Champ. ex Benth.; H. L. Li, Woody Fl. Taiwan 601. 1963. p. p.

小乔木,高10—15米。枝条粗壮,淡黄褐色,嫩枝四棱形。叶片近革质,卵形至椭圆形,长7.5—12厘米,宽4—6.3厘米,顶端钝至急尖或浑圆,基部极短尖,边缘向外反卷,上面暗绿色,下面的侧脉微隆起;叶柄长5—12毫米。花杂性,异株,单生叶腋,花梗长6—10毫米。雄花萼片4枚,2大2小,外方2枚圆形,椭圆状匙形;花瓣倒卵形,长9—10毫米,雄蕊4束,束柄粗壮,每束具多数花药,药室长圆形,纵裂,退化雌蕊圆柱形,细长。雌花未见。果椭圆球形或圆球形,长2—3厘米,径约2厘米,外面光滑。

产台湾东部。生于山坡上。模式标本采自台湾台东县兰屿。

本种近菲律宾产的 *Garcinia dives* Pierre,但不同点为叶宽阔,花单生叶腋。未见到标本,仅据 N. Robson 的描述加以整理,暂未列入检索表。

4. 猪油果亚科——MORONOBEOIDEAE ENGL.

Engl. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(6):241. 1895.

乔木或灌木;叶片对生;花两性,同株,雄蕊多数,基部合生成5束或合生成雄蕊管,花柱长,柱头5裂;浆果不具假种皮,子叶和胚乳不明显。

约5属,主要分布在热带非洲和热带美洲,我国南部引种1属。